

Adic space

<https://ryo1203.github.io>

概要

Adic 空間論についてのゼミを行っているので、発表したところを随時 PDF 化していく。大筋は Adic 空間についての原論文である [Hu93] と [Hu94] に沿っているつもりである。これらに記載のない命題などについては可能な限り出典を記載した。証明については [Mor] や [Wed] など一部参考になっている。

目次

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Huber ring | 1 |
| 1.1 | Huber ring の定義 | 1 |
| 1.2 | Huber ring の性質 | 4 |
| 1.3 | Huber ring の完備化 | 7 |
| 1.4 | adic 射 | 11 |
| 2 | Valuation spectrum | 14 |
| 2.1 | 付値と付値スペクトラム | 14 |
| 2.2 | $\text{Spv}(A, I)$ について | 21 |
| 3 | Continuous valuations of Huber rings | 25 |
| 3.1 | 連続付値 | 25 |
| 3.2 | Huber pair と adic spectrum | 31 |
| 3.3 | analytic point | 33 |
| 3.4 | Huber pair の完備化 | 43 |

1 Huber ring

1.1 Huber ring の定義

記法 1.1. A を環、 B, C を A の部分集合とすると、 $B \cdot C$ によって、 B と C の元の一つずつの積の有限和からなる集合を表す。すなわち、

$$B \cdot C := \left\{ \sum_{i=1}^n b_i c_i \mid n \in \mathbb{Z}^+, b_i \in B, c_i \in C \right\} \quad (1.1)$$

である。

定義 1.2 (非アルキメデスの位相環). 位相環 A が非アルキメデスの (non-Archimedean) であるとは、 A の加法部分群からなる $0 \in A$ の基本近傍系が存在することである。

注意 1.3. 位相環 A の開であるような加法部分群 B は閉でもあることがわかる。実際、加法群としての分割を考えると $A = \sqcup_{i \in I} (a_i + B)$ をなる。平行移動であることから $a_i + B$ も A で開集合になる。とくにある $i_0 \in I$ で $a_{i_0} = 0$ となるように取れるから、 $B = A \setminus \sqcup_{i \neq i_0} (a_i + B)$ であり、右辺は開集合の和集合なのでその補集合である B は A で閉集合になる。

定義 1.4 (有界・冪有界・位相的冪零元・adic). A を位相環とする。

1. A の部分集合 B が有界 (bounded) であるとは、 $0 \in A$ の任意の開近傍 U に対して、ある開近傍 $0 \in V \subset A$ が存在して、任意の $b \in B$ と任意の $v \in V$ の積 bv が U に含まれることである。
2. A の元 a が冪有界 (power-bounded) であるとは、 A の部分集合 $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が有界であることである。
3. A の元 a が位相的冪零元 (topologically nilpotent) であるとは、 A の点列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ が $0 \in A$ への収束列になることである。
4. A が adic であるとは、ある A のイデアル I が存在して、 $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が $0 \in A$ の基本近傍系を為すことである。このイデアルのことを A の定義イデアル (ideal of definition) と呼ぶ。

注意 1.5. 位相環 A が非アルキメデスであるとする。このとき $B \subset A$ が有界であることは、和で閉じているものからなる基本近傍系が取れることから、 $0 \in A$ の任意の開近傍 U に対してある開近傍 $0 \in V \subset A$ が存在して、 $B \cdot V \subset U$ となることと同値である。

記法 1.6. 位相環 A の冪有界元全体を A° と表し、位相的冪零元全体を $A^{\circ\circ}$ と表すこととする。

定義 1.7 (Huber ring・Tate ring). A を位相環とする。

1. A が Huber ring あるいは f-adic ring であるとは、ある部分集合 U と有限集合 $T \subset U$ であって、 $\{U^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が $0 \in A$ の基本近傍系を為し、 $T \cdot U = U^2 \subset U$ を満たすものが存在することである。
2. 位相的冪零な単元のことを pseudo-uniformizer と呼ぶ。 A が Tate であるとは、 A が Huber ring であり、pseudo-uniformizer を持つことである。

[Hu93] では f-adic ring と名付けており、[SW] では Huber ring と名付けている。以下では Huber ring と呼ぶこととする。ちなみに、[Ran] には f-adic ring の f は命題 1.9 にあるように、以下で定義される定義イデアルというものがある有限生成で取れることに依ると述べられている。

定義 1.8 (定義環・定義イデアル). A を位相環とし、その部分環 A_0 について、 A_0 が A の定義環 (ring of definition) であるとは、 A_0 が A で開であり、その相対位相によって A_0 が adic ring となることである。 A の定義イデアル (ideal of definition) とは、ある定義環の定義イデアル (定義 1.4) のことである。

定義環と定義イデアルについて次の性質が成り立っている。

命題 1.9. A を Huber ring とし、 A_0 をその部分環とする。

1. A は定義環を持つ。
2. A_0 が A の定義環 $\iff A_0$ が A で開かつ有界。
3. A のすべての定義環は有限生成な定義イデアルを持つ。

証明. A が Huber ring より取ることのできる部分集合 U とその有限部分集合 T を一つ固定する。

(1) W を U によって加法的に生成される A の部分加法群とする。このとき $A_0 := \mathbb{Z} \cdot 1 + W$ とすると A_0 は $U^2 \subset U$ より $W^2 \subset W$ から A の部分環になり、 $U \subset A_0$ であるから A の中で開である。さらに、 $T \subset U \subset A_0$ より T で生成されるイデアル $I := TA_0$ を考える。このイデアルによって A_0 が adic になることを示す。まず $T \cdot U = U^2 \subset U$ より、 $U^2 = T \cdot U \subset TA_0 = I$ から I は開である。 $T \subset U$ から $T^2 \subset T \cdot U$ と $T \cdot W \subset U^2$ から

$$I^2 = T^2 A_0 = T^2 + T^2 \cdot W \subset T \cdot U + T \cdot U^2 \subset T \cdot U = U^2 \quad (1.2)$$

であるので $\{U^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が基本近傍系になっていることから、 $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ も A_0 の基本近傍系になる。故に A_0 は adic な開部分環になるから A の定義環になる。

(2) (\implies) A_0 が定義環のとき、まず定義から A_0 は開であり、基本近傍系 $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ について $I^n \cdot A_0 = I^n$ より A_0 は有界。

(\impliedby) 任意の正整数 n について $T(n) := \{t_1 \dots t_n \mid t_1, \dots, t_n \in T\}$ とする。 A_0 が開なので、ある $k \in \mathbb{Z}^+$ が存在して $U^k \subset A_0$ である。 $T \subset U$ より $T^k \subset U^k \subset A_0$ から $T(k) \subset A_0$ である。 T が有限集合だから $T(k)$ も有限集合なのでとくに有限生成イデアル $I := T(k)A_0 \subset A_0$ を取ることができる。 $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が A_0 の基本近傍系になることを示す。 $U^l \subset A_0$ となる $l \in \mathbb{Z}^+$ が取れるから $T \cdot U = U^2$ より $I^n = (T(k)A_0)^n = T(nk)A_0 \supset T(nk)U^l = U^{l+nk}$ となるので任意の正整数 n について I^n は開になる。任意の $0 \in A$ の開近傍 V について A_0 が有界よりとくに、ある正整数 m で $U^m \cdot A_0 \subset V$ となる。 $T \subset U$ から、 $I^m = T(mk)A_0 \subset U^{mk} \cdot A_0 \subset U^m \cdot A_0 \subset V$ より $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ は基本近傍系を為す。ゆえに A_0 はこの有限生成イデアル I を定義イデアルとする adic な開部分環になるので A の定義環になる。

(3) A_0 が定義環なら (2) を経由して有限生成イデアルを取り直せる。 □

以上を踏まえて、[SW] や [Hu94] など多くの文献では Huber ring を以下の同値な条件で定義している。

命題 1.10. 位相環 A について Huber ring であることと有限生成イデアルを定義イデアルとする定義環を持つことは同値。

証明. まず命題 1.9 から Huber ring は有限生成イデアルを定義イデアルとする定義環を持つ。逆に有限生成イデアル I を定義イデアルとする定義環 A_0 が取れるとき、 $U := I$ とし、その有限部分集合 $T \subset U$ を I の有限個からなる生成系として取ればよい。 □

この同値条件は扱いやすいが、定義イデアルを取るときに定義環という枠組みが必要になっている。そこ

で、定義イデアルをイデアルとしてではなく、非単位的有限生成環だと思ふことで定義環という枠組みは必要なくなる。実際、命題 1.9 の証明のように $\mathbb{Z} \cdot 1 + W$ のようなものを考えてしまえば非単位的有限生成環からそれを定義イデアルとして持つような定義環は構成できる。それ故、最低限必要な条件を考えると最初の定義 1.7 の方に妥当性があると思ふこともできる。

以下では命題 1.9 と命題 1.10 の同値性をとくに言及せずに用いる。次のような Huber ring の例がある。とくに adic ring ではない Huber ring はたしかに存在する。

例 1.11. 1. 有限生成イデアルによって定まっている adic ring は Huber ring である。

2. 環 A とその有限生成イデアル I について、 $A[X]$ に

$$U_n := \left\{ \sum_{k=0}^m a_k X^k \in A[X] \mid a_k \in I^{n+k}, m \in \mathbb{Z}^+ \right\} \quad (1.3)$$

を $0 \in A$ の基本近傍系とする位相を入れる。このとき、 $A[X]$ は Huber ring になるが、任意の正整数 m で $I^m \neq I^{m+1}$ ならば adic ring ではない。

3. $(k, |\cdot|)$ を非自明な非アルキメデスの付値体とする。(例えば \mathbb{Q}_p など) $(A, \|\cdot\|)$ をノルム付き k 代数とし、 A にこのノルムからなる位相を入れると A は Tate ring になる。
4. 環 B とその元 s について、局所化 $\varphi: B \rightarrow B_s$ をとり、 B_s に $\{\varphi(s^n B) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ を $0 \in B_s$ の基本近傍系とする位相を入れれば、 B_s は $s \in B_s$ を pseudo-uniformizer とする Tate ring になる。

証明. (2) $I = (f_1, \dots, f_r)$ としたとき $U := U_1$ は $A[X]$ で開であり、 $T := \{f_1, \dots, f_r\}$ とすると $T \subset U_1$ より $T \cdot U \subset U^2$ である。逆の包含を示す。任意の U の元 $f(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ と $g(X) = \sum_{k=0}^{m'} b_k X^k$ についてその積 $f(X)g(X) = \sum_{k=0}^{m+m'} (\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}) X^k$ について、 $a_i \in I^{i+1}$ かつ $b_{k-i} \in I^{k-i+1}$ より $a_i b_{k-i} \in I^{k+2}$ より $\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \in I^{k+2} = T \cdot I^{k+1}$ となる。ゆえに $f(X)g(X) \in T \cdot U_1 = T \cdot U$ より $TU = U^2$ となる。また、このことよりとくに $U^2 \subset U_2 \subset U_1 = U$ より $\{U^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ も $A[X]$ の基本近傍系になるので $A[X]$ は Huber ring になる。

一方、任意の正整数 m について $I^m \neq I^{m+1}$ のとき $A[X]$ が adic にならないことを示す。もしイデアル $J \subset A[X]$ で adic になったとすると任意の正整数 k について $U_n \subset J^k \subset U_m$ となる正整数 $n \geq m$ が存在する。 $I^n \neq I^{n+1}$ と $I^{n+1} \subset I^n$ よりある $\alpha \in I^n \setminus I^{n+1}$ が取れる。 $U_n \subset J^k$ から $\alpha \in J^k$ であり、 J^k がイデアルだからとくに任意の 0 以上の整数 i について $\alpha X^i \in J^k \subset U_m$ である。ゆえにこの任意の i について $\alpha \in I^{m+i}$ となる。しかし、十分大きい i を取ると $\alpha \in I^{m+i} \subset I^{m+1}$ となり、 $\alpha \in I^n \setminus I^{n+1}$ に矛盾する。よって $A[X]$ は adic ではない。

(3) $A_0 := \{a \in A \mid \|a\| \leq 1\}$ とし、非自明なノルムであることからある $r \in k$ で $0 < |r| < 1$ となるものが取れる。このとき $\{r^n A_0 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が基本近傍系を為し、 $U := A_0$ かつ $\{r^n\}$ とすれば A は Huber ring になり、pseudo-uniformizer として $r \in A$ が取れる。□

1.2 Huber ring の性質

Huber ring において十分多くの定義環が存在する。

命題 1.12. A を Huber ring とする。

1. A_0 と A_1 を A の定義環とすると $A_0 \cap A_1$ と $A_0 \cdot A_1$ も定義環になる。
2. A の有界な部分環 B と A の開部分環 C であって $B \subset C$ となるものについて A の定義環 A_0 で $B \subset A_0 \subset C$ となるものが存在する。
3. A の冪有界元全体 A° は A の部分環で A の定義環すべての和集合と一致する。
4. A の任意の開部分環 A' について、それに含まれる A の定義環 A_0 が存在する。

証明. (1) A_0 と A_1 は開かつ有界よりその共通部分 $A_0 \cap A_1$ は開であり、有界な集合の部分集合は有界なので $A_0 \cap A_1$ は有界でもあるから $A_0 \cap A_1$ は定義環になる。

$A_0 \cdot A_1$ について $A_0 \subset A_0 \cdot A_1$ より開である。有界であることを示す。とくに十分小さい $0 \in A$ の開近傍 U を取って和で閉じているとして良い。 A_0 が有界より十分小さくとして、ある $0 \in A$ の開近傍 V_0 であって和で閉じていて $V_0 \cdot A_0 \subset U$ となるものが取れる。この V_0 について A_1 が有界より、ある $0 \in A$ の開近傍 V_1 が存在して $V_1 \cdot A_1 \subset V_0$ となる。ここで $A_0 \cdot A_1$ の元 $\sum x_i y_i (x_i \in A_0, y_i \in A_1)$ について、 $y_i \cdot V_1 \subset A_1 \cdot V_1 \subset V_0$ と $x_i \cdot V_0 \subset A_0 \cdot V_0 \subset U$ より

$$\left(\sum x_i y_i\right) \cdot V_1 \subset \sum (x_i y_i \cdot V_1) \subset \sum (x_i \cdot V_0) \subset \sum U \subset U \quad (1.4)$$

より $(A_0 \cdot A_1) \cdot V_1 \subset U$ なので $A_0 \cdot A_1$ は有界だから $A_0 \cdot A_1$ は定義環になる。

(2) C について、 $C_0 := A_0 \cap C$ とすると、 A_0 と C は A で開なので C_0 は A で開である。さらに A_0 が A で有界で $C \subset A_0$ よりとくに C も A で有界であるから C_0 も A の定義環になる。とくに $C_0 \subset C$ で C の定義環にもなるのでこれによって C も Huber ring になる。ゆえに $B \subset C$ と有界性から (1) の証明を用いて $B \cdot C_0$ も C で有界かつ $B \subset B \cdot C_0$ から C で開になる。これによって $B \cdot C_0$ は C の定義環になって B を含む。 C が A で開であることと合わせて $B \cdot C_0$ は A で開かつ有界であり、 $B \subset B \cdot C_0 \subset C$ より、 A_0 としてこの $B \cdot C_0$ と取ればよい。

(3) A° が定義環の和集合になっていることを示す。まず、 A の定義環は有界よりその任意の元は冪有界になるから定義環の和集合は A° に含まれる。 A の定義環 A_0 を一つ固定する。任意の A° の元 x について $\{x^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が有界であることから (1) の証明と同様にして $\{x^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cdot A_0 = A_0[x]$ は有界であり、 A_0 を含むので開集合でもあるから A の定義環になる。ゆえに定義環の和集合の中に $A_0[x]$ が含まれるのでとくに x も含まれるので互いの包含関係が示された。

A° が部分環であることは、任意の A° の元 x と y についてある定義環 A_0 と A_1 で $x \in A_0$ と $y \in A_1$ となるものが存在し、(1) から $x + y \in A_0 \cdot A_1 \subset A^\circ$ かつ $xy \in A_0 \cdot A_1 \subset A^\circ$ なので A° は部分環になる。

(4) A はある定義環 B を持つ。このとき $B \cap A'$ は B に含まれている部分環で B の有界性から $B \cap A'$ も有界な部分環。 A' は開だったので (2) を $B \cap A' \subset A'$ に適用すれば良い。□

命題 1.9 から次が従う。

系 1.13. A を位相環とする。

1. A が adic ring のとき、 A が Huber ring $\iff A$ が有限生成定義イデアルを持つ。
2. A が Huber ring のとき、 A が adic ring $\iff A$ が有界になる。
3. B を A の開部分環とすると、 A が Huber ring。 $\iff B$ が Huber ring。

Huber ring A について、 A° は有界とは限らない。 $A^\circ = \cup A_0$ であり、これは有界集合 A_0 の和集合が必ずしも有界ではないという形になっている。すなわち、 $0 \in A$ を原点と見るとき、 A_0 の中では距離が有限であるが、ちょうど A° を境界その外側に距離無限大の地点が存在している。これを踏まえて特に次の Huber ring のクラスを定義する。

定義 1.14 (一様). A を Huber ring とするとき、 A が一様 (uniform) であるとは、 A° が有界であることである。 A° が定義環になることと言ってもよい。

後に定める整元環 A^+ によって、空間の点として取る付値に制限をつけるが、これは A° とは異なる距離無限大との境界として A^+ を取ることに対応している。

冪有界元と位相的冪零元の集合に関する性質を見る。

命題 1.15. A を Huber ring とする。 A° で冪有界元全体を、 $A^{\circ\circ}$ で位相的冪零元全体を表す。(記法 1.6) このとき以下が成り立つ。

1. A° は A の中で開かつ整閉である。
2. $A^{\circ\circ}$ は A° の根基イデアルになる。
3. A が完備であるとき、 A^\times は A の開集合になる。

証明. (1) A の定義環は開集合であり、命題 1.12(3) から A° が定義環を含むことから A° は開集合になる。 A° が整閉になることを示す。 A° 上整な $x \in A$ を取る。ある $a_0, \dots, a_{n-1} \in A^\circ$ が存在して $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ となる。命題 1.12 から各 a_i についてそれを含むある定義環が取れ、有限個からなるその和集合も定義環になる。その定義環を A_0 とおく。すると $x \in A$ は A_0 上整になっているから $A_0[x] = A + Ax + \dots + Ax^{n-1} \subset A$ と書ける。すると $A[x]$ は有界集合になっている。実際、任意の $0 \in A$ の開近傍 U について A_0 は有界だから、ある $0 \in A$ の開近傍 V が存在して $A \cdot V \subset U$ となる。 V が和で閉じているとしてよいのでそのようにする。各 x, \dots, x^{n-1} に対して一点集合が有界だから、ある $0 \in A$ の開近傍 V_1, \dots, V_{n-1} が存在して $x^i V_i \subset V$ となる。よって $W := V_1 \cap \dots \cap V_{n-1}$ という $0 \in A$ の開近傍 W を取ると

$$(A_0[x]) \cdot W \subset (A_0x) \cdot V_1 + \dots + (A_0x^{n-1}) \cdot V_{n-1} \subset A_0 \cdot V + \dots + A_0 \cdot V \subset U + \dots + U \subset U \quad (1.5)$$

より $A_0[x]$ は有界である。よって $A_0[x]$ も A の定義環だから $A_0[x] \subset A^\circ$ となるのでとくに $\{x^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \subset A_0[x]$ から x は A で冪有界になるので $x \in A^\circ$ より A° は A において整閉である。

(2) $A^{\circ\circ} \subset A^\circ$ を示す。 A のある定義環の定義イデアルを I とする。任意の $a \in A^{\circ\circ}$ について任意の正整数 m についてある正整数 N が存在して $n \geq N$ で $a^n \in I^m$ となる。また、有限集合 $\{a, a^2, \dots, a^{N-1}\}$ は有界集合より、ある正整数 m' が存在して $k = 1, \dots, N-1$ で $a^k I^{m'} \subset I^m$ となる。すると $n \geq N$ の a^n について $a^n I^{m'} \subset I^m I^{m'} \subset I^m$ から $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\} I^{m'} \subset I^m$ より a は冪有界なので $A^{\circ\circ} \subset A^\circ$ となる。 $A^{\circ\circ}$ が和で閉じていることを示す。 $a, a' \in A^{\circ\circ}$ を取る。任意の $0 \in A$ の開近傍 U についてある正整数 N が存在して任意の $n \geq N$ で $a^n, (a')^n \in U$ となる。とくに U が和で閉じているとして良い。展開式を考えると任意の $n \geq 2N$ で $(a + a')^n \in U$ となる。したがって $a + a' \in A^{\circ\circ}$ なので和で閉じている。また、任意の $b \in A^\circ$ について $ab \in A^{\circ\circ}$ であることを示す。 b が冪有界より、ある $0 \in A$ の開近傍 V が存在して任意の正整数 n で $b^n V \subset U$ となる。 V について、ある正整数 N が存在して任意の $n \geq N$ で $a^n \in V$ となる。よって任意の

$n \geq N$ で $(ab)^n = a^n b^n \in b^n V \subset U$ より $ab \in A^{\circ\circ}$ となるから $A^{\circ\circ}$ は A° のイデアルになる。

根基イデアルであることを示す。 $a \in A^\circ$ が $a^m \in A^{\circ\circ}$ となったとする。任意の $0 \in A$ の開近傍 U を取ると有限集合 $\{a, \dots, a^{m-1}\}$ についてある $0 \in A$ の開近傍 V が存在して $k = 1, \dots, m-1$ で $a^k V \subset U$ となる。この V についてある正整数 N が存在して $n \geq N$ で $(a^m)^n \in V$ となる。すると、任意の $n \geq mN$ について $n = mk + r$ となる整数 $N \leq k$ と $0 \leq r \leq m-1$ が存在する。 $k \geq N$ より

$$a^n = a^{mk+r} = (a^m)^k a^r \in a^r V \subset U \quad (1.6)$$

から a は位相的冪零元になるので $A^{\circ\circ}$ は A° の根基イデアルになる。

(3) まず、任意の $a \in A^{\circ\circ}$ について、Neumann 級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ が A で収束することを示す。 A の定義イデアル I を一つ固定する。 $a^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ だったから、任意の正整数 k について十分大きい正整数 N によって $a^N \in I^k$ となる。すると、 I^k は A° のイデアルであるので、(2) で示したとおり $A^{\circ\circ} \subset A^\circ$ だから任意の $n \geq N$ について $a^n \in I^k$ となる。ゆえに $n > m \geq N$ ならば $(\sum_{i=0}^n a^i) - (\sum_{i=0}^m a^i) = a^n + \dots + a^{m+1} \in I^k$ となるので $(\sum_{i=0}^n a^i)_{n=0}^{\infty}$ は A のコーシー列だから A の完備性より $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ は A で収束する。とくに、演算の連続性と合わせて $(1-a) \sum_{n=0}^{\infty} a^n = 1 \in A$ だから $1-a \in A^\times$ となる。ゆえに、 $A^{\circ\circ}$ が A で開集合であることと合わせて、 $1 \in A$ の開近傍 $1+A^{\circ\circ}$ は A^\times に含まれる。ここで、任意の $a \in A^\times$ について、 A 上で a を掛ける写像は同相写像であることより、 $a(1+A^{\circ\circ}) = a + aA^{\circ\circ}$ は a の開近傍になっている。 $a \in A^\times$ と $1+A^{\circ\circ} \subset A^\times$ と合わせて、 $a + aA^{\circ\circ} \subset A^\times$ なので、任意の A の可逆元 a について、 A^\times に含まれる開近傍 $a + aA^{\circ\circ}$ が取れるので、 A^\times は A の開集合になる。 \square

とくに Tate ring のときは次のようにわかりやすい形になる。

命題 1.16. A を Tate ring とし、 B を A の定義環とするととき次が成り立つ。

1. B は A のある pseudo-uniformizer を持つ。
2. $s \in B$ を A の pseudo-uniformizer とすると $A = B_s$ であり、 sB が B の定義イデアルになる。

証明. (1) $t \in A$ を pseudo-uniformizer とするとき、 B が $0 \in A$ の開近傍より、 $t^n \rightarrow 0$ より十分大きい $k \in \mathbb{Z}^+$ によって $t^k \in B$ となる。 t^k も pseudo-uniformizer よりこれを取れば良い。

(2) 任意の $a \in A$ について $s^n \rightarrow 0$ より $s^n a \rightarrow 0$ であるから B が $0 \in A$ の開近傍より十分大きい $k \in \mathbb{Z}^+$ で $s^k a \in B$ になるので $a \in B_s$ から $s \in A^\times$ と合わせて $A = B_s$ となる。

また、任意の正整数 n について $s^n \in A^\times$ より $A \rightarrow A; a \mapsto s^n a$ は同相であるから、 B が A で開なので $s^n B$ は開である。また、 B の定義イデアル I が $0 \in A$ の開近傍より $s^n \rightarrow 0$ より十分大きい $k \in \mathbb{Z}^+$ で $s^k \in I$ となるものが取れる。よって $s^n B \subset I$ より B の I から定まる位相は sB によって定まる位相と一致するので B は sB を定義イデアルとして持つ。 \square

1.3 Huber ring の完備化

以下、完備(化)と言ったら Hausdorff 完備(化)のことを指すこととする。

定義 1.17 (完備化). A を Huber ring とし、定義環 A_0 とその定義イデアルを I を取る。このとき A の完備化 (completion) とは $\varprojlim A/I^n$ のことであり、それを \widehat{A} と表す。ここで $I^n \subset A$ は A_0 のイデアルとしての冪であり、剰余環とその逆極限は加法群として考えて取っている。とくにこれは定義環とその定義イデアルのとり方によらないことが、定義イデアルが基本近傍系を為していることからわかる。

補題 1.18. A を Huber ring とし、 B を A の定義環とし、その定義イデアルを I とする。 \widehat{A} と \widehat{B} を A と B の完備化とする。とくに完備化の左完全性から $\widehat{B} \subset \widehat{A}$ とみなせる。このとき次が成り立つ。

1. \widehat{A} は Huber ring であり、 \widehat{B} は \widehat{A} の定義環であり、 $I\widehat{B} = \widehat{I}$ は \widehat{B} の定義環になる。
2. 次の図式

$$\begin{array}{ccc} \widehat{A} & \longleftarrow & A \\ \uparrow & & \uparrow \\ \widehat{B} & \longleftarrow & B \end{array}$$

は可換で (環の圏において) 押し出しになっている。である。とくに $\widehat{A} \cong \widehat{B} \otimes_B A$ が成り立つ。

証明. (1) B が adic より I 進位相の一般論より \widehat{B} は $I\widehat{B} = \widehat{I}$ を定義イデアルとする adic ring になる (補題 3.26)。さらに、 A も $\{I^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ による完備化だから \widehat{A} は $\{\widehat{I}^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ を基本近傍系に持つ。ゆえに \widehat{B} は開かつ \widehat{I} を定義イデアルに持つ adic ring より \widehat{A} はこれを定義環と定義イデアルとして持つ Huber ring になる。

- (2) 次の図式

$$\begin{array}{ccccc} & & \widehat{A} & & \\ & & \longleftarrow & & \\ & & \uparrow & & \\ & & \widehat{B} \otimes_B A & \xleftarrow{f} & A \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & \widehat{B} & \xleftarrow{k} & B \\ & & \uparrow & & \\ & & \widehat{A} & & \end{array}$$

(Note: The diagram shows a commutative diagram with \widehat{A} at the top left, $\widehat{B} \otimes_B A$ in the middle, A to its right, \widehat{B} at the bottom left, and B at the bottom right. Arrows are labeled i, j, f, k, l, g .)

を考える。とくに i, ι, k, l はすべて単射であるので \widehat{A} の部分環と考えることができる。ここで、 $\widehat{B} \otimes_B A$ にある位相を入れることで、 $j: \widehat{B} \otimes_B A \rightarrow \widehat{A}$ が位相環としての同型射になることを示す。そのために逆射 $h: \widehat{A} \rightarrow \widehat{B} \otimes_B A$ を構成する。まず、とくに \widehat{B} が \widehat{A} の部分加法群であるので注意 1.3 と同様に分割 $\widehat{A} = \sqcup_{i \in I} (\widehat{a}_i + \widehat{B})$ を考えることができる。ここで \widehat{B} が開集合であり、 \widehat{A} において A が稠密なので各 $\widehat{a}_i + \widehat{B}$ についてある $a_i \in A \cap (\widehat{a}_i + \widehat{B})$ が取れるから、これらですべて取り替えて $A = \sqcup_{i \in I} (a_i + \widehat{B})$ とできる。したがって、とくに $\widehat{A} = A + \widehat{B}$ と書ける。ゆえに任意の \widehat{A} の元 \widehat{a} についてある $a \in A$ と $\widehat{b} \in \widehat{B}$ によって $\widehat{a} = a + \widehat{b}$ と書ける。ここで h を

$$\begin{aligned} h: \widehat{A} &\longrightarrow \widehat{B} \otimes_B A \\ \widehat{a} = a + \widehat{b} &\longmapsto h(\widehat{a}) := f(a) + g(\widehat{b}) (= 1 \otimes a + \widehat{b} \otimes 1) \end{aligned}$$

と定める。 h が j の逆の位相環の準同型になっていることを示す。

h が写像であることを示す。 $a, a' \in A$ と $\hat{b}, \hat{b}' \in B$ によって $\hat{a} = a + \hat{b} = a' + \hat{b}'$ となったとする。 $A \ni a - a' = \hat{b}' - \hat{b} \in \hat{B}$ である。ここで、 \hat{A} の部分環とみなすことで $A \cap \hat{B} = B$ が成り立つ。実際、 \hat{B} は \hat{A} における B の閉包に等しく、相対位相を持つので位相空間論の一般論 ([MSE1]) を $A \cap B \subset A \subset \hat{A}$ に適用することで $A \cap \hat{B} = A \cap \overline{B^{\hat{A}}} = \overline{A \cap B^{\hat{A}}}$ となる。 B は A の開部分環だったので注意 1.3 と合わせて $\overline{A \cap B^{\hat{A}}} = \overline{B^{\hat{A}}} = B$ となるので $A \cap \hat{B} = B$ が成り立つ。これを用いて、 $a - a' = \hat{b}' - \hat{b} \in A \cap \hat{B} = B$ となるから、図式の可換性より $f(a - a') = f(u(a - a')) = g(k(a - a')) = g(k(\hat{b}' - \hat{b})) = g(\hat{b}' - \hat{b})$ である。したがって、 $f(a') + g(\hat{b}') = f(a' - a) + f(a) + g(\hat{b}') = g(\hat{b}' - \hat{b}) + f(a) + g(\hat{b}) = f(a) + g(\hat{b})$ より、 $h(\hat{a})$ は $\hat{a} = a + \hat{b}$ の表示のとり方によらないで定まるので h は写像になる。

表示によらないことと定義から h について (a) 加法的、(b) $f = h|_A$ 、(c) $g = h|_{\hat{B}}$ (d) $h(1) = 1$ が成り立つ。 h が環準同型であることを示すためには、積を保つことを示せば良い。任意の $\hat{a} \in \hat{A}$ について \hat{A} で A が稠密より、ある A の点列 (a_n) が存在して $a_n \rightarrow \hat{a}$ となるものが取れる。上述の (b) より $f(a_n) = h(a_n) \in \hat{B} \otimes_B A$ である。ここで、 $\hat{B} \otimes_B A$ が $f: A \rightarrow \hat{B} \otimes_B A$ と $h: \hat{A} \rightarrow \hat{B} \otimes_B A$ が連続とするような完備位相環の構造を持つことが示されれば十分である。実際、 (a_n) が収束列だったので f と h の連続性から $\hat{B} \otimes_B A$ 内の点列 $(f(a_n)) = (h(a_n))$ はとくにコーシー列になる。さらに $\hat{B} \otimes_B A$ の完備性からこの点列は収束するので $h(\hat{a}) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ となる。よって、 \hat{A} の元 $\hat{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ と $\hat{a}' = \lim_{n \rightarrow \infty} a'_n$ について、 $\hat{a}\hat{a}' = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n a'_n$ となることから、 $\hat{B} \otimes_B A$ が位相環、とくに積の連続性から \lim と積を交換でき、 f はもともと環準同型なので $h(\hat{a}\hat{a}') = \lim_{n \rightarrow \infty} h(a_n a'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n a'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} f(a'_n) = h(\hat{a})h(\hat{a}')$ となるので h が積を保つことがわかる。

そのような構造が $\hat{B} \otimes_B A$ に入ることを示す。まず、上の図式で $j \circ g = l$ は単射なので $g: \hat{B} \rightarrow \hat{B} \otimes_B A$ も単射になる。 $\hat{B} \otimes_B A$ の位相を $g: \hat{B} \rightarrow \hat{B} \otimes_B A$ が開埋め込みになる位相を入れる。 g が連続になり、(c) より h も \hat{B} において連続だから、とくに $0 \in \hat{B} \subset \hat{A}$ で連続である。よって (b) から f も $0 \in A \subset \hat{A}$ で連続である。 f はもともと環準同型であり、 h は (a) から加法的なので 0 での連続性からそれぞれの定義域全体で連続になる。

また、 \hat{B} の完備性から $g(\hat{B})$ も完備になるので $\hat{B} \otimes_B A$ も完備になる。実際、 $\hat{B} \otimes_B A$ のコーシー列 (x_n) を取ると、 $g(\hat{B})$ が開集合として埋め込まれていたから、ある $N \in \mathbb{Z}^+$ が存在して、任意の N 以上の整数 n と m について $x_n - x_m \in g(\hat{B})$ となる。とくに任意の $n \geq N$ について $x_n - x_N \in g(\hat{B})$ より、ある $\hat{b}_n \in \hat{B}$ によって $x_n = x_N + g(\hat{b}_n)$ となる。任意の 0 の開近傍 $U \subset \hat{B}$ について g が開埋め込みより $g(U)$ は $0 \in \hat{B} \otimes_B A$ の開近傍だから N 以上の $M \in \mathbb{Z}^+$ が存在して、 M 以上の整数 n と m について $x_n - x_m \in g(U)$ となる。 N 以上なので、 $x_n - x_m = (x_N + g(\hat{b}_n)) - (x_N + g(\hat{b}_m)) = g(\hat{b}_n) - g(\hat{b}_m) \in g(U)$ であり、 g は単射だったから $\hat{b}_n - \hat{b}_m \in U$ となるので、 (\hat{b}_n) も \hat{B} のコーシー列になる。 \hat{B} の完備性から (\hat{b}_n) は、ある $\hat{b} \in \hat{B}$ に収束する。十分大きい n において $x_n - (x_N + g(\hat{b})) = g(\hat{b}_n) - g(\hat{b}) \in g(U)$ であるので、 g が開埋め込みより $g(U)$ の形のもので $0 \in \hat{B} \otimes_B A$ の開近傍は全てだから、 $x_n \rightarrow x_N + g(\hat{b})$ となるから、 $\hat{B} \otimes_B A$ は完備である。

$\hat{B} \otimes_B A$ がこの位相で位相環になることを示す。 \hat{B} が位相群だから、 $\hat{B} \otimes_B A$ はすでに位相群になっているので、積の連続性を示せば良い。まず、 $\hat{b} \otimes a \in \hat{B} \otimes_B A$ と任意の 0 の開近傍 $U \subset \hat{B} \otimes_B A$ について $(\hat{b} \otimes a) \cdot V \subset U$ となる 0 の開近傍 $V \subset \hat{B} \otimes_B A$ が存在することを示す。 $g^{-1}(U)$ が \hat{B} で開なので、ある \hat{B} の開イデアル S が存在して $S \subset g^{-1}(U) \subset \hat{B}$ となる。 \hat{B} は \hat{A} で開集合だったので S は \hat{A} においても開である。上で示した $A \cap \hat{B} = B$ より $S \cap A \subset \hat{B} \cap A = B \subset A$ となり、 $S \cap A$ は A で開かつ B に含まれる。ここで、 $\{a\} \subset A$ は有界であるから A の開集合 $S \cap A$ に対して、ある 0 の開近傍 $T \subset B$ が存在して、 $a \cdot T \subset S \cap A \subset B \subset A$ となっている。 B において T が開なので、 $T \cdot \hat{B}$ は \hat{B} において開になっているから、

その g による像 $g(T \cdot \widehat{B})$ は $\widehat{B} \otimes_B A$ における開集合になる。 $V := g(T \cdot \widehat{B})$ として、これが求める開集合であることを示す。すなわち、 $(\widehat{b} \otimes a) \cdot V \subset U$ を示す。 $T \subset B$ より $g(T) = g(k(T)) = f(\iota(T)) = f(T)$ に注意すると、 $V = g(T \cdot \widehat{B}) = g(T) \cdot g(\widehat{B}) = f(T) \cdot g(\widehat{B})$ である。任意の $t \in T$ について、 $f(t) = 1 \otimes t \in \widehat{B} \otimes_B A$ より $(\widehat{b} \otimes a) \cdot f(t) = \widehat{b} \otimes at$ となる。まず、 $at \in a \cdot T \subset B$ だったので B 上のテンソルを取っていることから $\widehat{b} \otimes at = at(\widehat{b} \otimes 1) = \widehat{bat} \otimes 1 = (\widehat{b} \otimes 1) \cdot (at \otimes 1)$ となる。さらに $at \in S \cap A \subset S \subset g^{-1}(U)$ から $at \otimes 1 = g(at) \in g(S) \subset U$ となるので $(\widehat{b} \otimes a) \cdot f(t) = (at \otimes 1) \cdot (\widehat{b} \otimes 1) \in g(S) \cdot g(\widehat{B})$ となる。ゆえに記法 1.1 の定義と S が \widehat{B} のイデアルであることに注意すると $(\widehat{b} \otimes a) \cdot V = (\widehat{b} \otimes a) \cdot f(T) \cdot g(\widehat{B}) = \{\widehat{b} \otimes at \mid t \in T\} \cdot g(\widehat{B}) \subset g(S) \cdot g(\widehat{B}) = g(S) \subset U$ となる。よって、この V が求める条件を満たすことが示された。

積の連続性を示す。任意の 0 開近傍 $U \subset \widehat{B} \otimes_B A$ を取る。十分小さくして和で閉じているようにできる。任意の $x \in \widehat{B} \otimes_B A$ について $\widehat{B} \otimes_B A$ の元 $y := \sum_{i=1}^n \widehat{b}_i \otimes a_i$ と $z := \sum_{j=1}^m \widehat{b}'_j \otimes a'_j$ であって、 $yz = x$ となるものを取る。ここで、 U について、各 $\widehat{b}_i \otimes a_i$ と $\widehat{b}'_j \otimes a'_j$ に対して上で示したように開集合 V が取れる。 $i = 1, \dots, n$ と $j = 1, \dots, m$ それぞれの添字について共通部分を取りそれを V_y と V_z とする。とくに $g(\widehat{B})$ が $\widehat{B} \otimes_B A$ で開集合かつ adic なので V_y と V_z を十分小さくすることで $V_y \cdot V_z \subset U$ となるようにできる。このとき $y + V_z$ と $z + V_y$ の積は $yz + z \cdot V_z + y \cdot V_y + V_z \cdot V_y$ に含まれる。これは $yz = x$ と $z \cdot V_z \subset U$ かつ $y \cdot V_y \subset U$ と合わせて $x + U$ に含まれる。よって $yz = x$ となるような元についてその開近傍 $(y + V_z) \times (z + V_y) \subset \widehat{B} \otimes_B A \times \widehat{B} \otimes_B A$ の積 $x + U$ に含まれるから $\widehat{B} \otimes_B A$ の積は連続である。

以上より確かに $\widehat{B} \otimes_B A$ は f と h を連続とするような完備位相環の構造が入るので h は環準同型になる。定義から $j \circ h = \text{id}_{\widehat{A}}$ である。さらに任意の $x \in f(A) \cup g(\widehat{B})$ については h の定義より $(h \circ j)(x) = x$ となる。 $h \circ j$ が環準同型より、 $(h \circ j)(\widehat{b} \otimes a) = (h \circ j)(g(\widehat{b})f(a)) = (h \circ j)(g(\widehat{b})) \cdot (h \circ j)(f(a)) = g(\widehat{b})f(a) = \widehat{b} \otimes a$ より $h \circ j = \text{id}_{\widehat{B} \otimes_B A}$ となる。さらに、 $j \circ g$ について開集合 $U \subset \widehat{A}$ の j による逆像を g で引き戻したものは図式の可換性から $U \cap \widehat{B}$ となるから \widehat{B} で開集合になる。よって、 $j^{-1}(U) \supset g(U \cap \widehat{B})$ であり、 g が開埋め込みであることから $j^{-1}(U)$ は開集合を含むのでこれ自身も開集合になる。よって j は連続。以上より、 j は連続であり、 h も連続であったから h と j は互いに逆な位相環の準同型になる。したがって位相環としての同型 $\widehat{A} \cong \widehat{B} \otimes_B A$ を得る。 \square

注意 1.19. \widehat{A} が押し出しの普遍性を満たすことを直接示すことは難しいと思われる。まず $A \cdot \widehat{B} = \widehat{A}$ と $A \cap \widehat{B} = B$ から $j: \widehat{B} \otimes_B A \rightarrow \widehat{A}$ が同型であることを証明するのは難しい。一般に環 A とその部分環 B と C について $D := B \cap C$ 上のテンソル積に関して $B \otimes_D C \rightarrow B \cdot C = A; b \otimes c \mapsto bc$ が写像であることを確かめるのは難しく、また、写像であったとしても単射であるとは限らない。実際、 B と C と D が体のときこれが単射になることは B と C が D 上線型無関係であるという定義がなされている。例えばこれが写像だが同型にならない反例として [SE1] がある。実際、[SE1] の記号のもとで、 $1 \otimes 1 + \omega \alpha \otimes \alpha^2 / 2 + \omega^2 \alpha^2 \otimes \alpha / 2 \in E \otimes_{\mathbb{Q}} F$ を取るとこれは $E \cdot F$ に移すと 0 になる。一方、 \mathbb{Q} 加群としての同型 $E \cong \mathbb{Q}^3$ と $F \cong \mathbb{Q}^3$ を考えると、この元に対応する $\mathbb{Q}^3 \otimes \mathbb{Q}^3 \cong \mathbb{Q}^9$ の元は 0 にならないことが計算によってわかり、単射ではない。

注意 1.20. ここで述べた補題 1.18 の証明は元を取って h を構成することによって示されていた。これは [Hu93] に沿って示したためであるが、そうではない証明が [GR] の Proposition 8.3.28(3) に記載されている。

系 1.21. A を Huber ring として \widehat{A} をその完備化とするとき次が成り立つ。

1. A がネーターである定義環を持つとき $A \rightarrow \widehat{A}$ は平坦射になる。
2. A がネーターである定義環上有限生成代数のとき A と \widehat{A} はネーター環になる。

証明. A のネーターな定義環を B とする。(1) 補題 1.18 より $A \rightarrow \widehat{A}$ は自然な射 $A \rightarrow \widehat{B} \otimes_B A$ である。 B がネーターかつ adic なので $B \rightarrow \widehat{B}$ が平坦になる。 $B \rightarrow A$ による底変換によって平坦性は保たれるから、 $A \cong B \otimes_B A \rightarrow \widehat{B} \otimes_B A$ も平坦になるから示された。

(2) 有限生成 B 代数よりある $x_1, \dots, x_n \in A$ によって $A = B[x_1, \dots, x_n]$ と表すことができる。 B がネーターより A はネーターになる。また、 $\widehat{A} \cong \widehat{B} \otimes_B A = \widehat{B} \otimes_B B[x_1, \dots, x_n] \cong \widehat{B}[x_1, \dots, x_n]$ になり、 B がネーターかつ adic なので \widehat{B} はネーターだから \widehat{A} はネーターになる。□

1.4 adic 射

Huber ring の間の射で良い性質を持つものを定義する。

定義 1.22 (adic 射). A と B を Huber ring とする。その間の環準同型 $f: A \rightarrow B$ が adic であるとは、 A の定義環 A_0 とその定義イデアル $I \subset A_0$ と B の定義環 B_0 であって、 $f(A_0) \subset B_0$ かつ I の拡大イデアル $f(I)B_0 \subset B_0$ が B_0 の定義イデアルになるものが存在することである。

注意 1.23. $f: A \rightarrow B$ が adic であるとき、 $I \subset f^{-1}(f(I)B_0)$ から f は連続写像になる。

定義イデアルの拡大については一般に次の主張が成り立っている。すなわち、大きいところで定義イデアルならその性質を下ろすことが出来る。

補題 1.24 ([Ran]Lemma 4.2.2 Lemma 4.2.6). A を Huber ring とする。 A の定義環 A_0 と A_1 が $A_0 \subset A_1$ となっているとする。 A_0 の有限生成イデアル I について以下は同値。

1. I が A_0 の定義イデアルである。
2. A_1 への拡大イデアル IA_1 が A_1 の定義イデアルである。

証明. (1) \implies (2) A_2 は定義環より、ある定義イデアル $J \subset A_2$ を持つ。 I は A_0 で開なので A_1 でも開になるからある正整数 n によって $J^n \subset I \subset A_0 \subset A_1$ となる。 A_1 へ拡大すると J^n は A_1 のイデアルだからそのまま $J^n \subset IA_1 \subset A_1$ となる。よって IA_1 は A_1 で開である。また、 $J \cap A_0 \subset A_0$ は開なので I が A_0 の定義イデアルよりある正整数 m で $I^m \subset J \cap A_0$ となる。 A_1 へ拡大すると $(IA_1)^m \subset (J \cap A_0)A_1 \subset J$ である。以上より、 IA_1 の定める位相と J の定める位相は一致するので I が有限生成であることと合わせて IA_1 は A_1 の定義イデアルになる。

(2) \implies (1) A_0 が A_1 で開であり、 IA_1 が A_1 の定義イデアルなのである正整数 n によって $(IA_1)^n = I^n A_1 \subset A_0$ となる。 I が有限生成より $(IA_1)^n$ の A_1 のイデアルとしての有限個からなる任意の生成系 $\{x_1, \dots, x_r\}$ を取ることが出来る。これらは A_0 に含まれているから A_0 上生成されるイデアル $J := A_0 x_1 + \dots + A_0 x_r \subset A_0$ を構成できる。とくに $J \subset (IA_1)^n$ となる。このとき $\{x_1, \dots, x_r\} \subset A_0$ と $(IA_1)^n \subset A_0$ から

$$\begin{aligned} (IA_1)^{n+n} &= (IA_1)^n(IA_1)^n = (IA_1)^n(A_1x_1 + \cdots + A_1x_r) \\ &= (IA_1)^n x_1 + \cdots + (IA_1)^n x_r \subset A_0x_1 + \cdots + A_0x_r = J \end{aligned}$$

となるので $(IA_1)^{2n} \subset J \subset (IA_1)^n$ から $\{(IA_1)^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\}$ が A の基本近傍系を為していることと J が有限生成な A_0 のイデアルより J は A_0 の定義イデアルになる。ここで $(IA_1)^n$ の A_1 上の生成系 $\{x_1, \dots, x_r\}$ は任意に取れていたの、とくに $I^n \subset A_0$ の A_0 上の有限個からなる生成系と取って J を構成することも出来る。よってこのとき $J = I^n$ であるから I^n は A_0 の定義イデアルになる。冪乗が定義イデアルなので直ちに I 自身が A_0 の定義イデアルであることが従う。 \square

補題 1.25. A と B を Huber ring としてその間の環準同型 $f: A \rightarrow B$ が adic であるとする。このとき以下が成り立つ。

1. f は有界である。すなわち、有界集合の f による像はまた有界集合になる。
2. A_1 と B_1 がそれぞれ A と B の定義環で $f(A_1) \subset B_1$ となっているとする。このとき A_1 の任意の定義イデアル J についてその拡大 $f(J)B_1$ は B_1 の定義イデアルになる。
3. A の定義環 A_1 と B の開部分環 B' が $f(A_1) \subset B'$ となっているとする。このときある B の定義環 B_1 で $f(A_1) \subset B_1 \subset B'$ となるものが存在する。

証明. $f: A \rightarrow B$ が adic であることから取れる定義環や定義イデアルに対して定義 1.22 と同じ記号を用いる。

(1) A の有界集合 T を取る。任意の B の 0 の開近傍 U について、 $f(I)B_0$ が B_0 の定義イデアルよりある正整数 n によって $(f(I)B_0)^n \subset U$ となる。よってとくに $I^n \subset f^{-1}((f(I)B_0)^n) \subset f^{-1}(U)$ となる。一方、 T の有界性からある正整数 m によって $I^m \cdot T \subset I^n$ となる。これより、

$$f(I^m) \cdot f(T) \subset f(I)^n \subset (f(I)B_0)^n \subset f(f^{-1}(U)) \subset U \quad (1.7)$$

となり、 $(f(I)B_0)^n$ が B_0 の元の積と和について閉じているので B_0 を掛けると $(f(I)B_0)^n \cdot f(T) \subset U$ となる。 $f(I)B_0$ は B_0 の定義イデアルであったからこれより $f(T)$ は B で有界であることが示された。

(2) $K := f(I)B_0$ とおく。特にこれは f が adic より B_0 の定義イデアルになっていた。 $f(J)B_1 \subset B_1$ が B_1 の定義イデアルになっていることを示せば良い。まず、 $A_2 := A_0 \cdot A_1$ と $B_2 := B_0 \cdot B_1$ は命題 1.12(1) よりそれぞれ A と B の定義環になっている。仮定より $f(A_0) \subset f(B_0)$ と $f(A_1) \subset f(B_1)$ が成り立っているので $f(A_2) \subset B_2$ が成り立っている。ここで、補題 1.24 を適用することで定義イデアルの拡大 $IA_2, JA_2 \subset A_2$ と $KB_2 \subset B_2$ はそれぞれの環の中の定義イデアルになる。 $f(A_2) \subset B_2$ から $f(IA_2)B_2 = f(I)B_2 = f(I)B_0B_2 = KB_2$ から $f(IA_2)B_2$ は B_2 の定義イデアルになる。(すなわち $f: A_2 \rightarrow B_2$ においては adic の性質がなりたっていることが示された (注意 1.26)) ここで $JA_2 \subset A_2$ の B_2 への拡大イデアル $L := f(JA_2)B_2 \subset B_2$ は B_2 の定義イデアルになる。実際、 IA_2 と JA_2 がともに A_2 の定義イデアルなのである正整数 n と m によって $(IA_2)^n \subset (JA_2)^m \subset IA_2$ となる。これを拡大して $(f(IA_2)B_2)^m \subset L^n \subset f(IA_2)B_2$ より $f(IA_2)B_2$ が B_2 の定義イデアルなので L も B_2 の定義イデアルである。ここで再度、補題 1.24 を $L = f(JA_2)B_2 = (f(J)B_1)B_2$ と $B_1 \subset B_2$ に適用すると $f(J)B_1 \subset B_1$ は B_1 の定義イデアルになっている。

(3) (1) と A_1 の有界性から $f(A_1)$ は B で有界。 $f(A_1) \subset B'$ に命題 1.12(2) を用いればよい。 \square

注意 1.26. 補題 1.25(2) の証明では一度大きい定義環 A_2 と B_2 まで考えて adic の性質が成り立っていること (定義イデアルの拡大が定義イデアルになること) を示し、補題 1.24 によってその性質を下の定義環 A_1 と B_1 に下ろすことによって示した。

系 1.27. Huber ring の間の射 $f: A \rightarrow B$ と $g: B \rightarrow C$ について以下が成り立つ。

1. f と g が adic ならばその合成 $g \circ f$ も adic になる。
2. f と g が連続であり、合成 $g \circ f$ が adic ならば g は adic になる。
3. A の開部分環 A' と B の開部分環 B' で $f(A') \subset B'$ となるとする。このとき $f' := f|_{A'}: A' \rightarrow B'$ について、 f が adic $\iff f'$ が adic。

証明. (1) f の adic 性より A と B の定義環 A_0 と B_0 であって $f(A_0) \subset B_0$ かつ A_0 の定義イデアル I で $f(I)B_0$ が B_0 の定義イデアルになるものが存在する。ここで g の adic 性から補題 1.25(1) より $g(B_0)$ が有界であり、 $g(B_0) \subset C$ について命題 1.12(2) よりある C の定義環 C_0 で $g(B_0) \subset C_0 \subset C$ となるものが取れる。さらに g が adic であり、この B_0 とその定義イデアル $f(I)B_0$ と C_0 について補題 1.25(2) より $g(f(I)B_0)C_0 = g(f(I))C_0$ は C_0 の定義イデアルになる。以上よりこの定義環 $A_0 \subset A$ と $C_0 \subset C$ と定義イデアル $I \subset A_0$ を取ると $(g \circ f)(A_0) \subset C_0$ かつ $(g \circ f)(I)C_0$ が C_0 の定義イデアルより $g \circ f$ は adic になる。

(2) $h := g \circ f$ とおく。次の可換図式のように g が adic になるような定義環 B_0 と C_0 と B_0 の定義イデアル J を構成する。

$$\begin{array}{ccccccc}
 C & \longleftarrow & C_0 & \longleftarrow & K & & \\
 g \uparrow & & g \uparrow & & g \uparrow & \swarrow g & \\
 B & \longleftarrow & g^{-1}(C_0) & \longleftarrow & B_0 & \longleftarrow & J := g^{-1}(K) \cap B_0 \\
 f \uparrow & & f \uparrow & & f \uparrow & & f \uparrow \\
 A & \longleftarrow & f^{-1}(B_0) & \longleftarrow & A_0 & \longleftarrow & f^{-1}(J) \cap A_0 \longleftarrow I
 \end{array}$$

C の定義環 C_0 とその定義イデアル K を一つ固定する。 g の連続性から $g^{-1}(C_0)$ は B の開部分環になる。命題 1.12(4) からある B の定義環 B_0 で $g^{-1}(C_0)$ に含まれるものが存在する。このとき g の連続性から $J := g^{-1}(K) \cap B_0$ は B_0 の開イデアルである。さらに f の連続性から $f^{-1}(B_0)$ は A の開部分環であって、 $f^{-1}(J)$ は $f^{-1}(B_0)$ の中の開イデアルである。再度、命題 1.12(4) からある A の定義環 A_0 であって $f^{-1}(B_0)$ に含まれるものが存在し、 $f^{-1}(J) \cap A_0$ は f の連続性から A_0 の開イデアルである。よって、ある A_0 の定義イデアル I であって $I \subset f^{-1}(J) \cap A_0$ となるものが取れる。以上の構成により、

$$h(A_0) = g(f(A_0)) \subset g(f(f^{-1}(B_0))) \subset g(B_0) \subset g(g^{-1}(C_0)) \subset C_0 \quad (1.8)$$

から $(g \circ f)(A_0) \subset C_0$ かつ $g(B_0) \subset C_0$ となる。 A_0 と C_0 が定義環であって $(g \circ f)(A_0) \subset C_0$ より $g \circ f$ が adic より補題 1.25(2) から A_0 の定義イデアル I について $(g \circ f)(I)C_0 \subset C_0$ は C_0 の定義イデアルになる。ここで構成から

$$(g \circ f)(I)C_0 \subset (g \circ f)(f^{-1}(J))C_0 \subset g(J)C_0 = g(g^{-1}(K) \cap B_0) \subset K \quad (1.9)$$

から $(g \circ f)(I)C_0 \subset g(J)C_0 \subset K$ となり C_0 の定義イデアル $(g \circ f)(I)C_0$ と K に含まれているので $g(J)C_0$ も C_0 の定義イデアルになる。よってこの定義環 B_0 と C_0 と B_0 の定義イデアル J を取ることによって g が

adic であることが分かった。

(3) (⇒) f が adic であるから A と B の定義環 A_0 と B_0 と A_0 の定義イデアル I が存在して $f(A_0) \subset B_0$ かつ $f(I)B_0$ が B_0 の定義イデアルになる。 A' と B' が開であることと A_0 と B_0 が開かつ有界であることから $A'_0 := A_0 \cap A' \subset A'$ と $B'_0 := B_0 \cap B' \subset B'$ はそれぞれ A' と B' の定義環になる。さらに $I \subset A_0$ について $I \cap A'_0 \subset A'_0$ は A'_0 の定義イデアルになる。ここでとくに A'_0 と B'_0 は A と B の定義環でもあり、 $f(A'_0) \subset f(B'_0)$ から補題 1.25(2) より $f(I \cap A'_0)B'_0 \subset B'_0$ は B'_0 の定義イデアルになる。したがって $f' = f|_{A'}$ もこれらによって adic になることが分かった。

(⇐) f' が adic であるから A' と B' の定義環 A'_0 と B'_0 と A'_0 の定義イデアル I' が存在して $f'(A'_0) = f(A'_0) \subset B'_0$ かつ $f'(I')B'_0 = f(I')B'_0$ が B'_0 の定義イデアルになる。ここで A' と B' が開なので A'_0 と B'_0 は A と B の定義環でもあり、 $I' \subset A'_0$ は A の定義環 A_0 としての定義イデアルにもなっているのでこれらを取ることによって f が adic になる。□

命題 1.28. $f: A \rightarrow B$ を Huber ring の間の連続準同型とする。 A が Tate であるとき、 B も Tate であって、 f は adic になる。

証明. まず、 A の定義環 A_0 を一つ固定し、それに含まれる pseudo uniformizers $s \in A_0$ をとる。 $\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = 0$ と f の連続性から $\lim_{n \rightarrow \infty} f(s)^n = 0$ より $f(s) \in B^\circ$ となる。命題 1.15 から $f(s) \in B^\circ$ であるから命題 1.12(3) からある定義環 B_1 が存在して $f(s) \in B_1$ となる。命題 1.16(2) から $f(s)B_1$ は B_1 の定義イデアルになる。同様に $s \in A_0$ より sA_0 は A_0 の定義イデアルになる。ここで f の連続性から $f^{-1}(B_1) \subset A$ は開集合よりある正整数 n で $s^n A_0 \subset f^{-1}(B_1)$ となるから $f(s^n A_0) \subset B_1$ となる。ここで $f(A_0)$ は B で有界になる。実際、 B_0 は有界であることから任意の $0 \in B$ の開近傍 U についてある $0 \in B$ の開近傍 V が存在して $B_0 \cdot V \subset U$ となる。ここで $f(s)^{-n}$ 倍写像は同相なので $(f(s)^{-n} B_0) \cdot (f(s)^n V) \subset U$ であり、 $f(s)^n V$ が $0 \in B$ の開近傍なので $f(s)^{-n} B_0$ も B で有界である。よって $f(A_0) \subset f(s)^{-n} B_0$ から $f(A_0)$ も B で有界である。ここで命題 1.12(2) から $f(A_0) \subset B_0 \subset B$ となる B の定義環 B_0 が存在する。 $f(s) \in B_0$ で $f(s)$ は pseudo uniformizer より $f(s)B_0$ は B_0 の定義イデアルになる。したがってこの A_0 と B_0 と定義イデアル sA_0 をとることによって $f: A \rightarrow B$ は adic になる。□

2 Valuation spectrum

Huber ring から空間を構成する。そのために取る点として以下で定める付値を取るようになる。付値に関する一般論を証明した後、定義 3.1 をわかりやすい形にするために定義 2.24 を定義する。

Γ を全順序 (乗法的) 可換群とする。 0 を任意の $\alpha \in \Gamma$ について $0 \cdot \alpha = 0 = \alpha \cdot 0$ かつ $\alpha \geq 0$ として定義して全順序モノイド $\Gamma \cup \{0\}$ を定義する。

2.1 付値と付値スペクトラム

定義 2.1. 全順序可換群 Γ の部分群 H が凸部分群 (convex subgroup) であるとは、任意の $a \leq b$ という H の元 a と b について $[a, b] := \{x \in \Gamma \mid a \leq x \leq b\} \subset H$ となることである。

定義 2.2 (付値). 環 A と全順序モノイド $\Gamma \cup \{0\}$ を取る。環 A 上の $\Gamma \cup \{0\}$ に値を持つ付値 (valuation) とは写像 $v: A \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ であって

- $v(x + y) \leq \max \{v(x), v(y)\}$,
- $v(xy) = v(x)v(y)$,
- $v(0) = 0$,
- $v(1) = 1$

を満たすものである。(すなわち乗法的半ノルムのことである)

定義 2.3 (値群・特徴部分群・付値の台). 付値 $v: A \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ を一つ固定する。 $\text{Im } v \setminus \{0\}$ で生成される Γ の部分群を v の値群 (value group) といひ Γ_v で表す。 $\{v(a) \in \Gamma \cup \{0\} \mid a \in A, v(a) \geq 1\}$ によって Γ_v で生成される凸部分群を v の特徴部分群^{*1} (characteristic subgroup) といひ $c\Gamma$ と表す。とくに $v: A \rightarrow \Gamma_v \cup \{0\}$ と制限して考えたときその特徴部分群を $c\Gamma_v$ と書ける。

付値 $v: A \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ に対して $\text{Supp}(v) := \text{Ker}(v) = v^{-1}(0)$ は A の素イデアルであり、これを v の台 (support) といひ。

注意 2.4. まず、 Γ_v は $\text{Im}(v) \setminus \{0\}$ で生成される群なので $v: A \rightarrow \Gamma_v$ が全射であるわけではない。さらに、特徴部分群は $v(a) \geq 1$ となる元をすべて含む群であるが、 $v(a) \leq 1$ なら $v(a)^{-1} \geq 1$ だが、 a^{-1} が A で存在するかどうかわからないため、「 $v(a)^{-1} = v(a^{-1}) \geq 1$ だから $v(a)^{-1} \in c\Gamma_v$ より $v(a) \in c\Gamma_v$ 」という論法は使えない。ゆえに $c\Gamma_v$ は Γ_v と一致するとは限らない。

命題 2.5. 付値 $v: A \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ について付値 $\bar{v}: \text{Frac}(A/\text{Supp}(v)) \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ であって以下の図式

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{v} & \Gamma \cup \{0\} \\ \downarrow & \nearrow \bar{v} & \\ \text{Frac}(A/\text{Supp}(v)) & & \end{array}$$

を可換にするものが唯一つ存在する。

この \bar{v} による $\text{Frac}(A/\text{Supp}(v))$ の付値環を $A(v)$ で表す。すなわち、 $A(v) := \{x \in \text{Frac}(A/\text{Supp}(v)) \mid \bar{v}(x) \leq 1\}$ となる。

証明. まず $A/\text{Supp}(v)$ 上で \bar{v} を構成する。 $a \in A$ の $A/\text{Supp}(v)$ への像を \bar{a} と表すことにする。このとき $\bar{v}(\bar{a}) := v(a)$ と定義する。 v は付値だからこの定義が代表元のとり方によらないことを示せば良い。 $\bar{a} = \bar{b}$ のとき $a - b \in \text{Supp}(v)$ から $v(b - a) = v(a - b) = 0 \leq v(a), v(b)$ となる。したがって強三角不等式から

$$v(a) \leq \max \{v(a - b), v(b)\} = v(b) \tag{2.1}$$

$$v(b) \leq \max \{v(b - a), v(a)\} = v(a) \tag{2.2}$$

^{*1} 特性部分群という言葉がすでにあるのでここでは仮に特徴部分群と訳した。

から $v(a) = v(b)$ となるので、代表元のとり方によらない。

$A/\text{Supp}(v)$ が整域であるのでその上の付値 \bar{v} はその商体 $\text{Frac}(A/\text{Supp}(v))$ 上へと拡張することが出来る。すなわち $\bar{v}(\bar{b}/\bar{a}) = v(b)/v(a)$ となっている。これは求める図式の可換性を持ち、その定義から一意的に定まる。 \square

定義 2.6. 環 A 上の付値 v と w が同値 (equivalent) であるとは、以下の互いに等しい条件を満たすことである。

1. 順序モノイドとしての同型射^{*2} $f: \Gamma_v \cup \{0\} \rightarrow \Gamma_w \cup \{0\}$ で $w = f \circ v$ となるものが存在する。

$$\begin{array}{ccc}
 & \Gamma_v \cup \{0\} & \\
 v \nearrow & & \downarrow f \\
 A & & \Gamma_w \cup \{0\}. \\
 w \searrow & &
 \end{array}$$

2. $\text{Supp}(v) = \text{Supp}(w)$ かつ $A(v) = A(w)$ となる。
3. 任意の A の元 a と b について $v(a) \geq v(b) \iff w(a) \geq w(b)$ が成り立つ。

さらにこの関係は付値全体の中で同値関係になる。

証明. 同値関係になることは明らかなのでこれらの三条件が等しいことを示せば良い。

- (1) \implies (2) (1) から順序モノイドとしての同型射 f をとると $f(0) = 0$ と単射性に注意すれば

$$a \in \text{Supp}(v) \iff v(a) = 0 \iff 0 = f(v(a)) = w(a) \iff a \in \text{Supp}(w) \quad (2.3)$$

より $\text{Supp}(v) = \text{Supp}(w) \subset A$ となる。この等号からとくに $K := \text{Frac}(A/\text{Supp}(v)) = \text{Frac}(A/\text{Supp}(w))$ であることに注意する。 K の元 x は $x = \bar{b}/\bar{a}$ と表すことができる。 $A(v), A(w) \subset K$ から集合として一致していることを示せば良い。命題 2.5 から $\bar{v}(x) = v(b)/v(a)$ と f が同型射であることに注意すると

$$\begin{aligned}
 x \in A(v) &\iff \bar{v}(x) \leq 1 \iff \frac{v(b)}{v(a)} \leq 1 \iff v(b) \leq v(a) \iff w(b) = f(v(b)) \leq f(v(a)) = w(a) \\
 &\iff \frac{w(b)}{w(a)} \leq 1 \iff \bar{w}(x) \leq 1 \iff x \in A(w)
 \end{aligned}$$

から $A(v) = A(w) \subset K$ であることが示された。

(2) \implies (3) $\text{Supp}(v) = \text{Supp}(w)$ から $A(v)$ と $A(w)$ を同じ体 $K := \text{Frac}(A/\text{Supp}(v)) = \text{Frac}(A/\text{Supp}(w))$ の中で考えることが出来るので $A(v) = A(w)$ が K の中で集合としての等号として意味を持つ。したがって (2) から

$$v(b) \leq v(a) \iff \bar{v}\left(\frac{\bar{b}}{\bar{a}}\right) = \frac{v(b)}{v(a)} \leq 1 \iff \frac{\bar{b}}{\bar{a}} \in A(v) = A(w) \iff \bar{w}\left(\frac{\bar{b}}{\bar{a}}\right) = \frac{w(b)}{w(a)} \leq 1 \iff w(b) \leq w(a) \quad (2.4)$$

^{*2} 順序を保つ全単射なモノイド間の準同型写像のこと。1 が単位元なので $f(1) = 1$ であり、さらに全射性と順序を保つことから $f(0)$ が $\Gamma_w \cup \{0\}$ の最小元になるので $f(0) = 0$ も従う。

より (3) が従う。

(3) \implies (1) $\Gamma_v \cup \{0\} = (\text{Im}(v) \setminus \{0\}) \cup \{0\}$ であるからその元はある $a \in A$ によって $v(a)$ と表せる。ここで

$$\begin{aligned} f: \Gamma_v \cup \{0\} &\longrightarrow \Gamma_w \cup \{0\} \\ v(a) &\longmapsto w(a) \end{aligned}$$

と定義すると (3) より $v(a) = v(b)$ のとき $w(a) = w(b)$ から f は写像になっている。 v と w が乗法的であることから f は積を保ち、 $f(1) = f(v(1)) = w(1) = 1$ からモノイド間の準同型になり、再度 (3) から f は順序を保つことがわかる。全単射性も (3) から従い、構成から $w = f \circ v$ も成り立っているから、この $f: \Gamma_v \cup \{0\} \rightarrow \Gamma_w \cup \{0\}$ を取れば良い。 \square

以上のことを踏まえて、まずは任意の環 A 上に付値を点としてとる位相空間を定義することが出来る。

定義 2.7 (付値スペクトラム). 環 A についてその上の付値全体の集合を定義 2.6 で定めた同値関係によって割った集合を $S(A)$ と表す。 $S(A)$ の元で代表元が v であるものも同じように v と書くこととする。このとき $S(A)$ の位相として任意の $a, b \in A$ に対して

$$\{v \in S(A) \mid v(a) \leq v(b) \neq 0\} \tag{2.5}$$

という形の集合で生成されるものをとる。この位相空間を改めて $\text{Spv}(A)$ と表し、これを A の付値スペクトラム (valuation spectrum) という。

事実 2.8 ([Hu93] Proposition 2.2). $\text{Spv}(A)$ は spectral space になる。

記法 2.9. 付値 $x \in \text{Spv}(A)$ と $f \in A$ について x が乗法的半ノルムであったり、 x を空間の点として f に代入しているように見たりするため、 $x(f) \in \Gamma_x \cup \{0\}$ を $|f(x)|$ と書くこともある。この記法に基づくと (2.5) は $f, g \in A$ に対して

$$\{x \in \text{Spv}(A) \mid |f(x)| \leq |g(x)| \neq 0\} \tag{2.6}$$

と書くことが出来る。

注意 2.10 ([SW] Definition 2.3.2). 開集合として (2.5) を取ることはスキームにおける基本開集合のような $\{x \in \text{Spv}(A) \mid |f(x)| \neq 0\}$ やリジッド幾何学における有理領域^{*3} $\{x \in \text{Spv}(A) \mid |f_1(x)| \leq |g(x)|, \dots, |f_r(x)| \leq |g(x)|\}$ (ただし $\{f_1, \dots, f_r, g\}$ はイデアルとして A を生成する) というものを開集合として含ませるということを意図している。もし $|g(x)| \neq 0$ の条件がなくなると、とくに $\{x \in \text{Spv}(A) \mid |f(x)| \neq 0\}$ を取ることができなくなってしまう。

注意 2.11. 定義 2.3 で定義した付値の台は

$$\begin{aligned} \text{Supp}: \text{Spv}(A) &\longrightarrow \text{Spec}(A) \\ v &\longmapsto \text{Supp}(v) \end{aligned}$$

^{*3} 実際、有理領域と呼ばれる集合を後に定義する。

という写像を与える。このときこれは定義 2.7 で定めた $\text{Spv}(A)$ の位相と $\text{Spec}(A)$ のザリスキー位相に関して連続写像になる。

証明. $f \in A$ に関する $\text{Spec}(A)$ の基本開集合 $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ の Supp による逆像が開集合なら良い。実際、

$$\text{Supp}^{-1}(D(f)) = \{x \in \text{Spv}(A) \mid f \notin \text{Supp}(x) = x^{-1}(0)\} = \{x \in \text{Spv}(A) \mid |f(x)| \neq 0\} \quad (2.7)$$

であり、これは $\text{Spv}(A)$ の開集合なので Supp は連続写像になる。 \square

定義 2.12 (付値スペクトラムの間の射). 環準同型 $f: A \rightarrow B$ と B 上の付値 $v: B \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ について

$$v|_A := \text{Spv}(f)(v) := v \circ f \quad (2.8)$$

と定義すると A 上の付値になっている。これによって付値スペクトラムの間の写像

$$\begin{aligned} \text{Spv}(f): \text{Spv}(B) &\longrightarrow \text{Spv}(A) \\ v &\longmapsto v \circ f \end{aligned}$$

を定めることができる。とくにこれは (2.5) の形の集合を移し合う連続写像になる。

証明. $v|_A$ が A 上の付値になることは f の準同型性から明らか。 $\text{Spv}(f)$ が連続写像になることを示す。 $\text{Spv}(A)$ の位相の準開基 $\{v \in \text{Spv}(A) \mid v(a) \leq v(b) \neq 0\}$ を任意に取る。ただし a, b は A の元である。このとき

$$\begin{aligned} \text{Spv}(f)^{-1}(\{v \in \text{Spv}(A) \mid v(a) \leq v(b) \neq 0\}) &= \{w \in \text{Spv}(B) \mid (w \circ f)(a) \leq (w \circ f)(b) \neq 0\} \\ &= \{w \in \text{Spv}(B) \mid w(f(a)) \leq w(f(b)) \neq 0\} \end{aligned}$$

よりこれは $f(a), f(b) \in B$ から得られる $\text{Spv}(B)$ の準開基なのでとくに開集合である。したがって $\text{Spv}(f)$ は (2.5) の形の集合を移し合う連続写像になる。 \square

まず、順序群を凸部分群で割ることによって新しい順序群が構成できることを確認する。

命題 2.13. Γ を可換な順序群とし、その凸部分群 H をとる。このとき自然な群準同型 $\pi: \Gamma \rightarrow \Gamma/H$ について $\pi(\Gamma_{\leq 1}^{*4}) = (\Gamma/H)_{\leq 1}$ となる順序が定まり、これによって Γ/H は順序群になる。

証明. $H \in \Gamma/H$ が単位元であることに注意する。 $\alpha, \beta \in \Gamma/H$ について

$$\alpha \leq H \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists g \in \Gamma_{\leq 1}, \alpha = \pi(g) \quad (2.9)$$

と定義する。すなわち、 $\alpha \leq \beta \iff \alpha\beta^{-1} \leq H$ となるようにするために

$$\alpha \leq \beta \stackrel{\text{def}}{\iff} \alpha\beta^{-1} \leq H \iff \exists g \in \Gamma_{\leq 1}, \alpha\beta^{-1} = \pi(g) \iff \exists g \in \Gamma_{\leq 1}, \alpha = \pi(g)\beta \quad (2.10)$$

*4 $\Gamma_{\leq 1} := \{\gamma \in \Gamma \mid \gamma \leq 1\}$.

と定義する。

反射律、反対称律、推移律を満たすことを示す。

反射律を示す。任意の $\alpha \in \Gamma/H$ について $g = 1 \in \Gamma_{\leq 1}$ を取れば $\alpha = \pi(g)\alpha$ より $\alpha \leq \alpha$ である。反対称律を示す。 $\alpha \leq \beta$ かつ $\beta \leq \alpha$ のときある $g, h \in \Gamma_{\leq 1}$ で $\alpha = \pi(g)\beta$ かつ $\beta = \pi(h)\alpha$ となる。すると $\alpha = \pi(g)\pi(h)\alpha = \pi(gh)\alpha$ より $\pi(gh) = H \in \Gamma/H$ より $gh \in H \subset \Gamma$ となる。 $g \leq 1$ かつ $h \leq 1$ から $gh \leq g \leq 1$ であり、 $gh \in H \subset \Gamma$ と H が凸部分群であることから $g \in [gh, 1] \subset H$ より $\pi(h) = H \in \Gamma/H$ となる。したがって $\alpha = \pi(g)\beta = H\beta = \beta$ より反対称律も成り立つ。推移律を示す。 $\alpha \leq \beta$ かつ $\beta \leq \gamma$ のときある $g, h \in \Gamma_{\leq 1}$ で $\alpha = \pi(g)\beta$ かつ $\beta = \pi(h)\gamma$ となる。これより $\alpha = \pi(gh)\gamma$ であり、 $g \leq 1$ から h を掛けて $gh \leq 1$ より $gh \in \Gamma_{\leq 1}$ なので $\alpha \leq \gamma$ となるので推移律も成り立つ。

また、任意の $\alpha, \beta \in \Gamma/H$ についてある $a, b \in \Gamma$ で $\alpha = \pi(a)$ と $\beta = \pi(b)$ となるものが取れて、 $\alpha = \pi(a) = \pi(ab^{-1})\pi(b) = \pi(ab^{-1})\beta$ であり、 ab^{-1} は 1 以上か 1 以下か必ず決まるので α と β は必ず比較できるので Γ/H は全順序集合になる。さらに $\alpha \leq \beta$ となる Γ/H の元と $\gamma \in \Gamma/H$ を任意にとると $(\alpha\gamma)(\beta\gamma)^{-1} = \alpha\beta^{-1} \leq H$ より定義から $\alpha\gamma \leq \beta\gamma$ より Γ/H は順序群になる。さらに $\pi(\Gamma_{\leq 1}) = (\Gamma/H)_{\leq 1}$ は (2.9) より分かる。□

位相空間 $\text{Spv}(A)$ における特殊化や一般化は付値の構成によって具体的に書くことが出来る。

命題 2.14. $v \in \text{Spv}(A)$ と Γ_v の凸部分群 H を一つ固定する。命題 2.13 から $\Gamma_v/H \cup \{0\}$ が定義できてこのとき写像 $v/H: A \rightarrow \Gamma_v/H \cup \{0\}$ と $v|_H: A \rightarrow H \cup \{0\}$ を次のように定義する。

$$v/H(a) = \begin{cases} v(a) \pmod H & (v(a) \neq 0) \\ 0 & (v(a) = 0). \end{cases} \quad (2.11)$$

$$v|_H(a) = \begin{cases} v(a) & (v(a) \in H) \\ 0 & (v(a) \notin H). \end{cases} \quad (2.12)$$

このとき次が成り立つ。

1. v/H は A の付値であり、 $\text{Spv}(A)$ において v の一般化になる。すなわち $v \in \overline{\{v/H\}}$ となる。
2. $v|_H$ は A の付値 $\iff c\Gamma_v \subset H$ であり、このとき $\text{Spv}(A)$ において v の特殊化になる。すなわち $v|_H \in \overline{\{v\}}$ となる。

証明. (1) v/H が付値になることは命題 2.13 より $\pi: \Gamma \rightarrow \Gamma/H$ が順序を保つ準同型であることから $v/H = \pi \circ v$ からわかる。 $v \in \overline{\{v/H\}}$ を示す。 $\text{Spv}(A)$ の位相を考えると $a, b \in A$ によって $v \in \{w \in \text{Spv}(A) \mid w(a) \leq w(b) \neq 0\}$ となるときに v/H も含まれることを示せば良い。実際、 $v(a) \leq v(b) \neq 0$ から π で移せば 0 でない元は定義から 0 に移らないので $v/H(a) = \pi(v(a)) \leq \pi(v(b)) = v/H(b) \neq 0$ より v/H も含まれる。

(2) 必要十分性に関係なく一般に成り立つことを確認する。 $v(1) = 1 \in H$ と $v(0) = 0 \notin H$ より $v|_H(1) = 1$ かつ $v|_H(0) = 0$ となっている。また、 A の元 a, b について $v(ab) \notin H$ となったとする。このとき定義から $v|_H(ab) = 0$ であり、 H が部分群であるので $v(a) \in H$ かつ $v(b) \in H$ ならば $v(ab) \in H$ より、その対偶を考えれば $v(a) \notin H$ または $v(b) \notin H$ である。したがって $v|_H(a) = 0$ または $v|_H(b) = 0$ よりその積 $v|_H(a)v|_H(b) = 0$ から $v|_H(ab) = v|_H(a)v|_H(b)$ が成り立つ。したがって $v(ab) \notin H$ のときは乗法性は満た

される。その他の $v(ab) \in H$ のときの乗法性と強三角不等式について確認すれば良い。

(\Leftarrow) $v|_H$ が乗法的であることを示す。上の議論から $v(ab) \in H$ の場合に $v|_H(ab) = v|_H(a)v|_H(b)$ を示せば良い。 $v(a)$ と $v(b)$ の対称性から

- (a) $v(a) \leq 1$ かつ $v(b) \leq 1$,
- (b) $v(a) \geq 1$ かつ $v(b) \geq 1$,
- (c) $v(a) \leq 1 \leq v(b)$

の場合を考える。 v の乗法性から (a) のとき $v(ab) \leq v(a), v(b) \leq 1$ であり、(b) のとき $1 \leq v(a), v(b) \leq v(ab)$ であるので H が凸部分群だから $v(ab) \in H$ より $v(a), v(b) \in H$ となる。このとき $v|_H(a) = v(a)$ かつ $v|_H(b) = v(b)$ より $v|_H(ab) = v(ab) = v(a)v(b) = v|_H(a)v|_H(b)$ なので乗法的である。(c) のとき $c\Gamma_v \subset H$ からとくに $1 \leq v(b)$ から $v(b) \in H$ となる。ゆえに $v(b)^{-1} \in H$ から $v(a) = v(ab)v(b)^{-1} \in H$ より (a)(b) の場合と同様に乗法性が成り立つ。

$v|_H$ が強三角不等式を満たすことを示す。 $a, b \in A$ について $v(a+b) \notin H$ なら $v|_H(a+b) = 0 \leq \max\{v|_H(a), v|_H(b)\}$ より成り立っている。 $v(a+b) \in H$ となっているとする。 $v(a+b) \leq \max\{v(a), v(b)\}$ であるので、 $v(a) \leq v(b)$ として $v(a+b) \leq v(b)$ であるとしてよい。 $1 \leq v(b)$ なら $c\Gamma_v \subset H$ から $v(b) \in H$ であり、 $v(b) \leq 1$ であっても $H \ni v(a+b) \leq v(b) \leq 1$ で H が凸部分群より $v(b) \in H$ である。常に $v|_H(a) \leq v(a)$ であるのでよって $v|_H(a) \leq v(a) \leq v(b) = v|_H(b)$ かつ $v|_H(a+b) = v(a+b) \leq v(b) = v|_H(b)$ だから $v|_H(a+b) \leq \max\{v|_H(a), v|_H(b)\}$ となるので強三角不等式を満たす。以上より $v|_H$ は A 上の付値になる。

(\Rightarrow) 背理法で示す。 $c\Gamma_v \not\subset H$ とすると H が凸部分群であり、 $c\Gamma_v$ は $\{v(a) \mid a \in A, v(a) \leq 1\}$ を含む最小の凸部分群であるからとくに $\{v(a) \mid a \in A, v(a) \leq 1\} \not\subset H$ となる。従って $f \in A$ で $v(f) > 1$ かつ $v(f) \notin H$ となるものが取れる。ここで $v(f) > 1 = v(1)$ より強三角不等式に関する性質から $H \ni v(f) = v(f+1)$ から $v|_H(f+1) = 0$ となる。仮定から $v|_H$ は A 上の付値なので $0 = v|_H(f) < v|_H(1) = 1$ より再度、強三角不等式に関する性質から $0 = v|_H(f+1) = v|_H(1) = 1$ より $0 \notin \Gamma$ に矛盾する。従って $c\Gamma_v \subset H$ である。

$v|_H \in \overline{\{v\}}$ を示す。 $a, b \in A$ で $v|_H \in \{w \in \text{Spv}(A) \mid w(a) \leq w(b) \neq 0\}$ となるものを任意に取る。 $v|_H(a) \leq v|_H(b) \neq 0$ からとくに $v(b) \in H$ である。 $v(a) \in H$ のとき $v(a) = v|_H(a) \leq v|_H(b) = v(b)$ である。 $v(a) \notin H$ で $v(b) < v(a)$ となったとする。 $c\Gamma_v \subset H$ から $v(a) < 1$ である必要があるが、このとき $H \ni v(b) < v(a) < 1$ で H が凸部分群なので $v(a) \in H$ となって矛盾する。従って $v(a) \leq v(b)$ となる。以上より $v \in \{w \in \text{Spv}(A) \mid w(a) \leq w(b) \neq 0\}$ となるので $v|_H \in \overline{\{v\}}$ となる。 \square


定義 2.15 (horizontal/vertical specialization). $v, w \in \text{Spv}(A)$ をとる。

1. w が v の horizontal specialization^{*5} であるとは、ある凸部分群 $H \subset \Gamma_v \cup \{0\}$ であり、 $c\Gamma_v \subset H$ となり、 $w = v|_H$ となることである。
2. w が v の vertical specialization^{*6} であるとは、ある凸部分群 $H \subset \Gamma_w \cup \{0\}$ であって $v = w|_H$ となることである。

*5 [Hu93] では primary specialization と呼んでいるが、[Mor] では horizontal specialization だったためそちらを採用した。

*6 [Hu93] では secondary specialization と呼んでいるが、[Mor] では vertical specialization だったためそちらを採用した。

水平や垂直という言葉の意味は次の図 1a と図 1b を考えるとわかる。図は [Mur] FIGURE 5 を参考にして
いる。



事実 2.16 ([Hu93] Lemma2.3). $v \in \text{Spv}(A)$ の任意の特殊化は v の vertical specialization の horizontal specialization である。

2.2 $\text{Spv}(A, I)$ について

以上のことを踏まえ、 $\text{Spv}(A)$ を更に扱いやすいもののみの集合へと制限するためにいくつかの定義と補題を扱う。

記法 2.17. 以下ではこの節が終わるまで、 A を環として、 A のイデアル I を、ある有限生成な A のイデアル J で $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ となるものが存在しているものとする。

定義 2.18 (cofinal). A 上の付値 $v: A \rightarrow \Gamma \cup \{0\}$ について $\gamma \in \Gamma \cup \{0\}$ が Γ の部分群 H において cofinal であるとは、任意の $h \in H$ についてある正整数 n が存在して $\gamma^n < h^{*7}$ となることである。

補題 2.19. $v(I) \cap c\Gamma_v = \emptyset$ ならば Γ_v の凸部分群 H であって、任意の $i \in I$ について $v(i) \in \Gamma_v$ が H で cofinal になるようなものが存在する。さらにそのような凸部分群の中で包含関係について最大な H がとれる。とくに $c\Gamma_v \subset H$ であり、 $v(I) \neq \{0\}$ なら $v(I) \cap H \neq \emptyset$ となる。

証明. $v(I) = \{0\}$ なら $H = \Gamma_v$ ととれば良い。 $v(I) \neq \{0\}$ となったとする。 J の有限個からなる生成系を T とする。 $h := \max\{v(t) \in \Gamma_v \mid t \in T\}$ を取る。 $H \subset \Gamma_v$ を h の生成する凸部分群とする。すなわち H は h の生成する巡回群の生成する凸部分群のことである。

*7 真の不等号であることに注意する。

$h < c\Gamma_v$ *⁸であることを示す。任意の $a \in \sqrt{J}$ について $\sqrt{J} = \sqrt{I}$ なのである正整数 n で $a^n \in I$ から仮定 $v(I) \cap c\Gamma_v = \emptyset$ より $v(a^n) = v(a)^n \notin c\Gamma_v$ である。もし $v(a) \geq 1$ なら $v(a)^n \geq 1$ より $v(a)^n \in c\Gamma_v$ となってしまふので $v(a) < 1$ である。もしある $\gamma \in c\Gamma_v$ で $v(a) \geq \gamma$ となったら $\gamma \leq v(a) < 1$ で $c\Gamma_v$ が凸部分群より $v(a) \in c\Gamma_v$ から $v(a)^n \in c\Gamma_v$ より矛盾するので任意の $\gamma \in c\Gamma_v$ で $v(a) < \gamma$ となる。 $T \subset \sqrt{J} = \sqrt{I}$ よりとくに $h < c\Gamma_v$ である。さらに $h < 1$ でもある。

任意の $i \in I$ で $v(i)$ が H で cofinal になることを示す。 H が h で生成される巡回群から生成される凸部分群なので補題 2.20 から、とくに任意の $\gamma \in H$ についてある正整数 n が存在して $h^n \leq \gamma$ となる。とくに $h < 1$ なので $h^{n+1} < h^n \leq \gamma$ となるので h は H で cofinal になる。任意の $t \in T$ で $v(t) \leq h$ から $v(t)^{n+1} \leq h^{n+1}$ より $v(t)$ も H で cofinal になる。 $h < c\Gamma_v$ から $h < c\Gamma_v < h^{-1}$ なので $c\Gamma_v \subsetneq H$ である。補題 2.21 の H を今考えている H で考えると $T \subset \mathfrak{c}$ と $J = TA$ から任意の $j \in J$ は $v(j)$ が H で cofinal になる。さらに $\sqrt{J} = \sqrt{I}$ より任意の $i \in I$ についてある正整数 n で $i^n \in J$ であるから $v(i^n) = v(i)^n$ が H で cofinal より $v(i)$ も H で cofinal になる。よってこの H を取ることによって求める性質を持つ凸部分群が存在することが示された。

この構成した H がそのようなもののうち最大のものであることを示す。 Γ_v の凸部分群 H' で任意の $i \in I$ で $v(i)$ が H' で cofinal になったとする。 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ から任意の $j \in J$ で $v(j)$ が H' で cofinal になるのでとくに上で取った h は H' で cofinal になる。よって任意の $\gamma \in H'$ で、ある正整数 n が存在して $h^n < \gamma$ となる。 $\gamma \leq 1$ となる $\gamma \in H'$ については $H \ni h^n < \gamma \leq 1$ から H が凸部分群だから $\gamma \in H$ となる。 $1 \leq \gamma$ となる $\gamma \in H'$ については $H \ni \gamma^{-1} \leq 1$ を考えることによって上と同様にして $\gamma^{-1} \in H$ だから $\gamma \in H$ となる。以上より $H' \subset H$ となるのでこの H は最大のものである。上記の証明からいずれの場合にしても $c\Gamma_v \subset H$ となる。

$v(I) \neq \{0\}$ のときは H の構成から $h = v(t)$ となる $t \in T \subset J$ について $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ より、ある正整数 n で $t^n \in I$ となる。従って $H \ni h^n = v(t)^n = v(t^n) \in v(I)$ より $H \cap v(I) \neq \emptyset$ となる。 \square

補題 2.20 ([Wed] Remark 1.9). H' を Γ の部分群であるとし、 H を H' から生成される凸部分群であるとする。このとき $\gamma \in \Gamma$ に対し、 γ が H に入っていることと、ある $h, h' \in H'$ で $h \leq \gamma \leq h'$ となることは同値になる。

証明. Γ の部分集合 H'' を

$$H'' := \{\gamma \in \Gamma \mid \exists h, h' \in H', h \leq \gamma \leq h'\} \quad (2.13)$$

と定義する。これが H' を含む最小の凸部分群であることを示せば H と一致することがわかるので証明ができる。 $H' \subset H''$ は定義より明らか。 H' を含む任意の凸部分群 C を取ると、任意の $\gamma \in H''$ についてある $h, h' \in H' \subset C$ で $h \leq \gamma \leq h'$ から C が凸部分群であることより $\gamma \in C$ となる。 C が Γ の部分群であることを示す。まず、 H' が Γ の部分群より $H' \ni 1 \leq 1 \leq 1 \in H'$ より $1 \in H''$ である。任意の $\alpha, \beta \in C$ についてそれぞれ $h \leq \alpha \leq h'$ と $g \leq \beta \leq g'$ となる H' の元 h, h', g, g' が取れる。ここで H' が部分群より $H' \ni hg \leq \alpha\beta \leq h'g' \in H'$ から $\alpha\beta \in H''$ となるので積について閉じている。また、この α について $H' \ni (h')^{-1} \leq \alpha^{-1} \leq h^{-1} \in H'$ から $\alpha^{-1} \in H''$ より逆元を持つ。また、 $\alpha \leq \gamma \leq \beta$ となる $\gamma \in \Gamma$ をとると

*⁸ 任意の $\gamma_v \in c\Gamma_v$ で $h < \gamma_v$ となるということ。

$H' \ni h \leq \alpha \leq \gamma \leq \beta \leq g' \in H'$ より $\gamma \in H''$ となる。以上より H'' は H' を含む最小の凸部分群になっているから $H = H''$ より求める主張が成り立つ。 \square

補題 2.21 ([Wed] Lemma 7.1, Proposition 1.20). A 上の付値 v について Γ_v の凸部分群 H で $c\Gamma_v \subsetneq H$ となっているとする。このとき \mathfrak{c} を $v(a)$ が H で cofinal となるような $a \in A$ の元全体とすると \mathfrak{c} は A のイデアルである。

証明. まず、 $a \in \mathfrak{c}$ と $b \in A$ について $v(b) \leq v(a)$ であるとき、正整数 n で $v(b)^n \leq v(a)^n$ から $v(a)$ が H で cofinal より $v(b)$ も H で cofinal である。これから、任意の $a, b \in \mathfrak{c}$ について $v(a+b) \leq \max\{v(a), v(b)\}$ から $a+b \in \mathfrak{c}$ となる。 $a \in \mathfrak{c}$ と $b \in A$ について $ab \in \mathfrak{c}$ を示す。 $v(b) \leq 1$ のとき $v(ab) \leq v(a)$ で $a \in \mathfrak{c}$ から上の議論から $ab \in \mathfrak{c}$ となる。 $v(b) > 1$ のとき、 $v(b) \in c\Gamma_v$ である。 $c\Gamma_v \subsetneq H$ から、ある $h \in H$ で $h < c\Gamma_v < h^{-1}$ となるものが取れる。 $v(a)$ が H で cofinal なので、ある正整数 n で $v(a)^n < h$ となるから $v(a)^n h^{-1} < 1$ である。 $v(b) \in c\Gamma_v < h^{-1}$ から $v(b)^{2n} < h^{-1}$ なので

$$v(ab)^{2n} = (v(a)v(b))^{2n} = v(a)^{2n}v(b)^{2n} < v(a)^n v(a)^n h^{-1} < v(a)^n \quad (2.14)$$

となり、 $v(a)^n$ も H で cofinal なので $v(ab)$ も H で cofinal になるから $ab \in \mathfrak{c}$ になる。以上より、 \mathfrak{c} は A のイデアルになる。 \square

定義 2.22 ($c\Gamma_v(I)$). 付値 $v \in \text{Spv}(A)$ について Γ_v の部分群 $c\Gamma_v(I)$ を補題 2.19 で構成した H を用いて

$$c\Gamma_v(I) := \begin{cases} c\Gamma_v & (v(I) \cap c\Gamma_v \neq \emptyset) \\ H & (v(I) \cap c\Gamma_v = \emptyset) \end{cases}$$

と定義する。定義から $c\Gamma_v, H \subset \Gamma_v$ であり、補題 2.19 から $c\Gamma_v \subset H$ より $c\Gamma_v \subset c\Gamma_v(I) \subset \Gamma_v$ が成り立っている。

補題 2.23. $v \in \text{Spv}(A)$ について以下は同値。

1. $\Gamma_v = c\Gamma_v(I)$ である。
2. $\Gamma_v = c\Gamma_v$ または、任意の $i \in I$ について $v(i)$ は Γ_v で cofinal になる。
3. $\Gamma_v = c\Gamma_v$ または、 I のある生成系 T が存在して、任意の $t \in T$ で $v(t)$ は Γ_v で cofinal になる。

証明. (1) \implies (2) $c\Gamma_v(I)$ の定義からわかる。

(2) \implies (1) $\Gamma_v = c\Gamma_v$ のとき、 $\Gamma_v = c\Gamma_v \subset c\Gamma_v(I) \subset \Gamma_v$ より $\Gamma_v = c\Gamma_v(I)$ となる。 $\Gamma_v \neq c\Gamma_v$ のとき、 $c\Gamma_v(I)$ は補題 2.19 の H に等しい。仮定から Γ_v は補題 2.19 の条件を満たしているので $c\Gamma_v(I) \subset \Gamma_v$ と $c\Gamma_v(I)$ の最大性から $\Gamma_v = c\Gamma_v(I)$ となる。

(2) \implies (3) 明らか。

(3) \implies (2) $\Gamma_v \neq c\Gamma_v$ のとき、 $c\Gamma_v \subsetneq \Gamma_v$ であるので補題 2.21 から I の生成系が Γ_v で cofinal なら任意の $i \in I$ で $v(i)$ も Γ_v で cofinal になる。 \square

定義 2.24 ($\text{Spv}(A, I)$). 以上の記号 (記法 2.17) を用いて $\text{Spv}(A)$ の部分空間として

$$\text{Spv}(A, I) := \{v \in \text{Spv}(A) \mid \Gamma_v = c\Gamma_v(I)\} \quad (2.15)$$

と定義する。

定義 2.25 (レトラクション). 写像 r を

$$\begin{aligned} r: \text{Spv}(A) &\longrightarrow \text{Spv}(A, I) \\ v &\longmapsto r(v) := v|_{c\Gamma_v(I)} \end{aligned}$$

と定義することができる。さらに、包含写像 $\iota: \text{Spv}(A, I) \rightarrow \text{Spv}(A)$ について $r \circ \iota = \text{id}_{\text{Spv}(A, I)}$ となる。

証明. まず、 $r(v) = v|_{c\Gamma_v(I)} \in \text{Spv}(A)$ であるから $\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_{r(v)}(I)$ を示せば良い。まず、 $c\Gamma_v \subset c\Gamma_v(I)$ に注意すると

$$\begin{aligned} \{r(v)(a) \mid a \in A, r(v)(a) \geq 1\} &= \{v(a) \mid a \in A, v(a) \geq 1, v(a) \in c\Gamma_v(I)\} \\ &= \{v(a) \mid a \in A, v(a) \geq 1\} \cap c\Gamma_v(I) \\ &= \{v(a) \mid a \in A, v(a) \geq 1\} \end{aligned}$$

となっているから、特徴部分群の最小性から $c\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_v$ となる。

$v(I) \cap c\Gamma_v \neq \emptyset$ のとき、定義 2.22 から $c\Gamma_v(I) = c\Gamma_v$ であるから $r(v) = v|_{c\Gamma_v(I)} = v|_{c\Gamma_v}$ であるので $r(v)$ の値域は $c\Gamma_v$ になっているから $c\Gamma_v = \Gamma_{r(v)}$ となる。よって、値域の制限を考えることで $v(I) \cap c\Gamma_v = r(v)(I) \cap c\Gamma_v$ である。上で示した $c\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_v$ と合わせて $\emptyset \neq v(I) \cap c\Gamma_v = r(v)(I) \cap c\Gamma_v = r(v)(I) \cap c\Gamma_{r(v)}$ となる。ゆえに定義から $c\Gamma_{r(v)}(I) = c\Gamma_{r(v)}$ であるから、以上のことをまとめて、 $c\Gamma_{r(v)}(I) = c\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_v = c\Gamma_v(I) = \Gamma_{r(v)}$ となる。

$v(I) \cap c\Gamma_v = \emptyset$ のときを考える。定義から任意の $i \in I$ について $v(i)$ は $c\Gamma_v(I)$ で cofinal になっている。 $c\Gamma_{r(v)} \neq c\Gamma_{r(v)}$ となったとする。 $\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_v(I)$ なので任意の $i \in I$ について $v(i)$ は $\Gamma_{r(v)}$ で cofinal になっているから、補題 2.23 より $\Gamma_{r(v)} = c\Gamma_{r(v)}(I)$ である。以上より $r(v) \in \text{Spv}(A, I)$ となることが示された。

また、任意の $v \in \text{Spv}(A, I)$ について $\Gamma_v = c\Gamma_v(I)$ より $r(v) = v|_{c\Gamma_v(I)} = v$ だから $r \circ \iota = \text{id}_{\text{Spv}(A, I)}$ である。□

この空間の中である特定の形の部分集合を取る。

定義 2.26. A の元 f_1, \dots, f_r, g が $I \subset \sqrt{(f_1, \dots, f_r)}$ となるとき、 $\text{Spv}(A, I)$ の部分集合 U を

$$U := \{v \in \text{Spv}(A, I) \mid v(f_1) \leq v(g) \neq 0, \dots, v(f_r) \leq v(g) \neq 0\} \quad (2.16)$$

と定義する。この形の部分集合は位相の定義から $\text{Spv}(A, I)$ の開集合であり、これら全体を \mathcal{S} と書くこととする。

spectral space について考えるときに扱うことになる構成可能集合についてまとめる。

定義 2.27. 位相空間 X について、 X の部分集合 C が**構成可能** (constructible) であるとは、ある quasi-compact な集合 U と V によって $C = U \cup (X \setminus V)$ となることである。 C が**副構成可能** (pro-constructible) であるとは、構成可能集合の和集合になっているものことである。

事実 2.28 ([Hu93] Remark 2.1). X を spectral space とし、 T を副構成可能集合とするとき、次が成り立つ。

1. T は quasi-compact である。
2. X の開集合が構成可能集合であることと、quasi-compact であることは同値である。

以上を踏まえて次の事実がある。

事実 2.29 ([Hu93] Proposition 2.6). $\text{Spv}(A, I)$ と \mathcal{R} について次が成り立つ。

1. $\text{Spv}(A, I)$ は spectral space になる。
2. \mathcal{R} は $\text{Spv}(A, I)$ の有限交叉で閉じた開基になり、 \mathcal{R} の元は $\text{Spv}(A, I)$ で構成可能集合である。(とくに \mathcal{R} の元は quasi-compact である)
3. レトラクション $r: \text{Spv}(A) \rightarrow \text{Spv}(A, I)$ は \mathcal{R} の元を \mathcal{R} に移し合う。
4. $v \in \text{Spv}(A)$ が $v(I) \neq \{0\}$ のとき $r(v)(I) \neq \{0\}$ となる。

3 Continuous valuations of Huber rings

Huber ring から得られる空間の点として採用する連続付値という概念を定義する。

3.1 連続付値

定義 3.1 (連続付値). A を Huber ring とし、 $v: A \rightarrow \Gamma_v \cup \{0\}$ を A 上の付値とする。 v が A 上の**連続付値** (continuous valuation) であるとは、任意の $\gamma \in \Gamma_v$ についてある $0 \in A$ の開近傍 U が存在して任意の $u \in U$ で $v(u) < \gamma$ となることである。すなわち、位相環であることから $v^{-1}([0, \gamma)) = \{a \in A \mid v(a) < \gamma\}$ が A の開集合になることである。

このとき A 上の連続付値全体を $\text{Cont}(A)$ で表し、 $\text{Spv}(A)$ の相対位相を入れる。

注意 3.2. v が連続付値であるとは、 $\Gamma_v \cup \{0\}$ に $[0, \gamma)$ という形から得られる位相を入れたとき、 v が連続写像になることと言い換えることができる。

定義 3.3. $f: A \rightarrow B$ を Huber ring の間の連続準同型であるとする。任意の $v \in \text{Cont}(B) \subset \text{Spv}(B)$ について定義 2.12 で定義した通り $\text{Spv}(f)(v) = v \circ f \in \text{Spv}(A)$ が取れる。このとき $\text{Spv}(f)(v)$ は A 上の連続付値である。とくに $\text{Spv}(f)$ の $\text{Cont}(A)$ への制限 $\text{Cont}(f) := \text{Spv}(f)|_{\text{Cont}(B)}$ を取ると $\text{Spv}(f)$ の連続性から連続写像 $\text{Cont}(f): \text{Cont}(B) \rightarrow \text{Cont}(A)$ を得る。

注意 3.4 ([Mur] Goal 1.2). とくに離散環 A を取るとその上の付値は常に連続だから $\text{Spv}(A) = \text{Cont}(A)$ となる。すなわち、

$$\begin{array}{ccccc} (\text{Ring})^{\text{op}} & \xrightarrow{\quad} & (\text{HubRing})^{\text{op}} & \xrightarrow{\text{Cont}} & (\text{Top}) \\ & \searrow & & \searrow & \uparrow \\ & & & & (\text{SpecSp}) \\ & & \text{Spv} & \searrow & \end{array}$$

という関係がある。

Huber ring A に対して $\text{Cont}(A)$ を定義 2.24 を用いて表すことが出来る。まず、 $A^{\circ\circ} \cdot A$ が記法 2.17 のイデアル I の条件を満たしていることを示す。

補題 3.5. Huber ring A について、 A の有限集合 T をとる。まず、 A の任意の定義イデアル I について $\sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A} = \sqrt{I \cdot A}$ となる。また、 $T \cdot A$ が A の開集合 $\iff A^{\circ\circ} \cdot A \subset \sqrt{T \cdot A}$ が成り立つ。

証明. $\sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A} = \sqrt{I \cdot A}$ を示す。 $\sqrt{I \cdot A}$ の任意の元 a を取ると、ある正整数 n で $a^n \in I \cdot A$ であり、 $I \subset A^{\circ\circ}$ だからその有限個からなる生成系について考えて十分大きい冪を取ると $a \in \sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A}$ であることがわかる。逆に、 I が開集合だから任意の $A^{\circ\circ}$ の元 a について、ある正整数 n で $a^n \in I$ となるので $A^{\circ\circ} \subset \sqrt{I \cdot A}$ となる。 A の根基イデアルになることに注意すれば $\sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A} \subset \sqrt{I \cdot A}$ がわかる。

(\Rightarrow) 任意の $A^{\circ\circ} \cdot A$ の元 a を取ると、ある A の元 a_1, \dots, a_n と $A^{\circ\circ}$ の元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ が存在して $a = a_1 \alpha_1 + \dots + a_n \alpha_n$ と書ける。 $T \cdot A$ が開集合より、十分大きい正整数 N_i によって $\alpha_i^{N_i} \in T \cdot A$ となるので、さらに十分大きい冪 a^N は $T \cdot A$ に含まれるから $A^{\circ\circ} \cdot A \subset \sqrt{T \cdot A}$ となる。

(\Leftarrow) 最初に示したとおり $\sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A} = \sqrt{I \cdot A}$ であるので $A^{\circ\circ} \cdot A \subset \sqrt{T \cdot A}$ の両辺で根基を取ると $\sqrt{I \cdot A} = \sqrt{A^{\circ\circ} \cdot A} \subset \sqrt{\sqrt{T \cdot A}} = \sqrt{T \cdot A}$ となる。 I は有限生成であるのでその生成系について十分大きい冪を取れば、ある正整数 N で $I^N \subset T \cdot A$ となるので $T \cdot A$ は A で開集合になる。 \square

定理 3.6. A を Huber ring とするとき、

$$\text{Cont}(A) = \{v \in \text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A) \mid \forall a \in A^{\circ\circ}, v(a) < 1\} \quad (3.1)$$

が成り立つ。記法 2.17 の仮定を $A^{\circ\circ} \cdot A$ が補題 3.5 で示したとおり満たしているので $\text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A)$ は定義できている。

証明. \subset を示す。 任意の $\text{Cont}(A)$ の元 w を取る。まず $w \in \text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A)$ を示す。任意の $A^{\circ\circ}$ の元 a と任意の $\gamma \in \Gamma_w$ を取る。 w の連続性から $\{\alpha \in A \mid w(\alpha) < \gamma\}$ は A の開集合であるので $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ より、ある正整数 n で $a^n \in \{\alpha \in A \mid w(\alpha) < \gamma\}$ となる。よって $w(a)^n < \gamma$ から $w(a)$ は Γ_w で cofinal になる。 $A^{\circ\circ} \cdot A$ の生成系 $A^{\circ\circ}$ の元 a について $w(a)$ が Γ_w で cofinal であることが示されたので、補題 2.23 より、 $\Gamma_w = c\Gamma_w(A^{\circ\circ} \cdot A)$ であるから $w \in \text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A)$ となる。とくに、 $\gamma = 1 \in \Gamma_w$ を取ると、上で示したとおり任意の $a \in A^{\circ\circ}$ について、ある正整数 N が存在して $w(a)^N < 1$ となるので $w(a) < 1$ より、 w は右辺の集合に含まれる。

\supset を示す。 右辺の集合に含まれる v を取る。

まず、任意の $a \in A^\circ$ について $v(a)$ が Γ_v で cofinal になることを示す。 $v \in \text{Spv}(A, A^\circ \cdot A)$ なので、 $\Gamma_v = c\Gamma_v(A^\circ \cdot A)$ である。 $\Gamma_v \neq c\Gamma_v$ のときは補題 2.23 から、任意の $a \in A^\circ \subset A^\circ \cdot A$ について $v(a)$ は Γ_v で cofinal であるのでよい。 $\Gamma_v = c\Gamma_v$ であるときを考える。任意の $a \in A^\circ$ と任意の $\gamma \in \Gamma_v$ について、 $\gamma \geq 1$ のときは $v(a) < 1 \leq \gamma$ となるのでよい。 $\gamma < 1$ のときを考える。 $\gamma \in \Gamma_v = c\Gamma_v$ であり、 $c\Gamma_v$ は $(\Gamma_v)_{\geq 1}$ で生成される部分群 $\{v(t)v(t')^{-1} \in \Gamma_v \mid t, t' \in A, v(t), v(t') \geq 1\}$ から生成される凸部分群であるので、補題 2.20 から、ある A の元 t と t' で $v(t')v(t)^{-1} \leq \gamma < 1$ となる。 $v(t') \geq 1$ より、 $v(t)^{-1} \leq \gamma < 1$ となる。ここで、 $a \in A^\circ$ から、 $n \rightarrow \infty$ で $ta^n \rightarrow 0$ であるので、 A° が A で開集合なので、ある正整数 N で $ta^N \in A^\circ$ となる。したがって、 v の仮定から $v(t)v(a)^N = v(ta^N) < 1$ であるので、 $v(a)^N < v(t)^{-1} \leq \gamma$ となるので、 $v(a)$ は Γ_v で cofinal になる。

この帰結を用いて v が連続になることを示す。 A が Huber ring であるので、ある有限集合 T と A の部分集合 U で $T \cdot U = U^2 \subset U$ で $\{U^n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ が $0 \in A$ の基本近傍系になるものが取れる。まず、 $0 \in A$ の基本近傍系であるので、 $U \subset A^\circ$ となるから、 v の仮定より任意の $u \in U$ で $v(u) < 1$ となる。 T が有限集合なので、 $h := \max\{v(t) \mid t \in T\}$ がとれる。 $T \subset U \subset A^\circ$ から、上で示したことより $v(h)$ が Γ_v で cofinal であるので、任意の $\gamma \in \Gamma_v$ について、ある正整数 n で $h^n < \gamma$ となる。ゆえに、 $(v(T))^n = \{v(t_1) \cdots v(t_n) \mid t_1, \dots, t_n \in T\}$ の任意の元について、 h の定義から $v(t_1) \cdots v(t_n) \leq h^n < \gamma$ となる。よって、任意の $U^{n+1} = T^n \cdot U$ の元 a を取ると、 a は T の n 個の元からなる積と U の元の積の有限和であるので、 $h^n < \gamma$ と合わせて $v(a) < \gamma$ となる。したがって $U^{n+1} \subset \{a \in A \mid v(a) < \gamma\}$ であるので A における開集合になるから v は連続である。以上より等号が示された。 \square

系 3.7. $\text{Cont}(A)$ は $\text{Spv}(A, A^\circ \cdot A)$ の閉集合になる。とくに事実 2.29 から $\text{Cont}(A)$ は spectral space である。

証明. $\text{Cont}(A)$ の補集合を考えると、 $\text{Spv}(A, A^\circ \cdot A) \setminus \text{Cont}(A) = \{v \in \text{Spv}(A, A^\circ \cdot A) \mid \exists a \in A^\circ\} = \cup_{a \in A^\circ} \{v \in \text{Spv}(A, A^\circ \cdot A) \mid v(1) \leq v(a)\}$ となり、 $\{v \in \text{Spv}(A, A^\circ \cdot A) \mid v(1) \leq v(a)\}$ は $\text{Spv}(A, A^\circ \cdot A)$ で開集合なので $\text{Cont}(A)$ は閉集合になる。 \square

以上の命題を用いて、 $\text{Cont}(A)$ ではなく、その中の $\text{Spa}(A, A^+)$ というものを定義するための準備をする。

定義 3.8. A を Huber ring とする。

$$\mathcal{F}_A := \left\{ \bigcap_{a \in S} \{v \in \text{Cont}(A) \mid v(a) \leq 1\} \mid S \subset A \right\} \quad (3.2)$$

$$\mathcal{G}_A := \{A^+ \subset A \mid A^+ \text{ は } A \text{ の整閉な開部分環}\} \quad (3.3)$$

という集合族を定義する。

注意 3.9. とくに命題 1.15 から $A^\circ \in \mathcal{G}_A$ となる。

これら \mathcal{F}_A と \mathcal{G}_A の間に一対一の対応がある。

定理 3.10. Huber ring A に対して次が成り立つ。

1. \mathcal{G}_A と \mathcal{F}_A の間の包含関係を逆にする写像

$$\begin{aligned} \sigma: \mathcal{G}_A &\longrightarrow \mathcal{F}_A \\ G &\longmapsto \{v \in \text{Cont}(A) \mid \forall g \in G, v(g) \leq 1\} \\ \tau: \mathcal{F}_A &\longrightarrow \mathcal{G}_A \\ F &\longmapsto \{a \in A \mid \forall v \in F, v(a) \leq 1\} \end{aligned}$$

は互いに逆写像になっている。とくに \mathcal{G}_A と \mathcal{F}_A には一対一の対応がある。

2. $G \in \mathcal{G}_A$ であって $G \subset A^\circ$ となるものを取る。このとき任意の $v \in \text{Cont}(A)$ は $\sigma(G)$ の元の vertical specialization になる。すなわち、ある Γ_v の凸部分群 H が存在して $v/H \in \sigma(G)$ となる。とくに $\sigma(G)$ は $\text{Cont}(A)$ で稠密になる。
3. A が Tate かつ Noether な定義環を持つとき、(2) の逆が成り立つ。すなわち、 $G \in \mathcal{G}_A$ について $\sigma(G)$ が $\text{Cont}(A)$ で稠密なら $G \subset A^\circ$ となる。

証明. (1) $\sigma \circ \tau = \text{id}_{\mathcal{F}_A}$ を示す。 \mathcal{F}_A の元 $F = \bigcap_{a \in S} \{v \in \text{Cont}(A) \mid v(a) \leq 1\}$ を取る。ただし S は A のある部分集合である。すると、 $\tau(F) = \{a \in A \mid \forall v \in F, v(a) \leq 1\}$ と $\sigma \circ \tau(F) = \{v \in \text{Cont}(A) \mid \forall g \in \tau(F), v(g) \leq 1\}$ である。任意の $v \in F$ について任意の $g \in \tau(F)$ について $v \in F$ から $v(g) \leq 1$ であるので $F \subset \sigma \circ \tau(F)$ である。逆に任意の $v \in \sigma \circ \tau(F)$ を取ると、任意の $g \in \tau(F)$ で $v(g) \leq 1$ となる。とくに S を 1 以下にするような付値によって 1 以下になる A の元全体が $\tau(F)$ なので $S \subset \tau(F)$ から、任意の $a \in S$ で $v(a) \leq 1$ となるので $v \in F$ になるから $\sigma \circ \tau(F) \subset F$ となるので $\sigma \circ \tau(F) = F$ となる。

$\tau \circ \sigma = \text{id}_{\mathcal{G}_A}$ を示す。 $G \in \mathcal{G}_A$ を取ると、 $\tau \circ \sigma(G)$ は G の元を全部 1 以下にするような付値によって 1 以下になるような A の元であるので、とくに $G \subset \tau \circ \sigma(G)$ となる。

$G \subsetneq \tau \circ \sigma(G)$ となったとして矛盾を導く。([Mur] FIGURE 5 に以下の証明に関する図がある) このとき、ある $a \in \tau \circ \sigma(G) \setminus G$ が取れる。もし a が冪零だったらある正整数 n で $a^n = 0 \in G$ であり、 G が整閉なので $a \in G$ となって矛盾する。ゆえに零環ではない $A[a^{-1}]$ の部分環 $G[a^{-1}]$ が取れる。もし $a \in G[a^{-1}]$ となったとすると a が G 上整になるので G の整閉性から $a \in G$ となり、 $a \notin G$ に反するので $a \notin G[a^{-1}]$ である。したがって、ある $G[a^{-1}]$ の素イデアル \mathfrak{p} であって $a^{-1} \in \mathfrak{p}$ となるものが取れる。 \mathfrak{q} を \mathfrak{p} に含まれる $G[a^{-1}]$ の極小素イデアルとする。ここで体 $K := \text{Frac}(G[a^{-1}]/\mathfrak{q})$ の中に局所部分環 $(G[a^{-1}]/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}}$ があるから、これを支配する K における付値環 R が存在する。すなわち、 $(G[a^{-1}]/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}} \subset R \subset K$ かつ $\mathfrak{p}/\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}_R$ となる。この R に関する乗法付値 $s': K \rightarrow \Gamma_1 \cup \{0\}$ を取ると可換図式

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \mathfrak{p}/\mathfrak{q} & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \mathfrak{m}_R & & \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
G[a^{-1}] & \longrightarrow & G[a^{-1}]/\mathfrak{q} & \xrightarrow{\text{dominant}} & R & \xrightarrow{s'} & (\Gamma_1)_{\leq 1} \cup \{0\} \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & (G[a^{-1}]/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}} & \xrightarrow{\text{dominant}} & R & \xrightarrow{s'} & \Gamma_1 \cup \{0\} \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & K = \text{Frac}(G[a^{-1}]/\mathfrak{q}) & \xrightarrow{s'} & & & \Gamma_1 \cup \{0\} \\
& \searrow & & \nearrow & & & \\
& & s & & & &
\end{array}$$

よって $G[a^{-1}]$ 上の付値 s が取れる。ここで s' は体 K における付値環 R に対応する付値なので $\text{Supp}(s') = \{0\} \subset K$ であることに注意すると $\text{Supp}(s) = \mathfrak{q}$ となる。さらに $G \subset G[a^{-1}] \subset R$ かつ $\mathfrak{p}/\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}_R$ より、任意の $g \in G$ で $s(g) \leq 1$ かつ任意の $x \in \mathfrak{p}$ で $s(x) < 1$ である。とくに $a^{-1} \in \mathfrak{p}$ から $s(a^{-1}) < 1$ となる。

ここで今度は $G[a^{-1}]_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow A[a^{-1}]_{\mathfrak{q}}$ を考える。 $A[a^{-1}]_{\mathfrak{q}}$ は零環ではないので、素イデアルが存在し、それらは $G[a^{-1}] \setminus \mathfrak{q} \subset A[a^{-1}]$ と共通部分を持たない $A[a^{-1}]$ の素イデアルと一対一に対応している。ここでそのような素イデアル $\tilde{\mathfrak{q}} \subset A[a^{-1}]$ を取ると、その $G[a^{-1}]_{\mathfrak{q}}$ への引き戻し $\tilde{\mathfrak{q}} \cap G[a^{-1}]$ は $G[a^{-1}]_{\mathfrak{q}}$ の素イデアルになって、次のような対応をしている。

$$\begin{array}{ccc}
G[a^{-1}] & \hookrightarrow & A[a^{-1}] \\
\downarrow & & \downarrow \\
G[a^{-1}]_{\mathfrak{q}} & \hookrightarrow & A[a^{-1}]_{\mathfrak{q}} \\
\tilde{\mathfrak{q}} \cap G[a^{-1}] & \hookrightarrow & \tilde{\mathfrak{q}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\tilde{\mathfrak{q}}A[a^{-1}]_{\mathfrak{q}} \cap G[a^{-1}]_{\mathfrak{q}} & \hookrightarrow & \tilde{\mathfrak{q}}A[a^{-1}]_{\mathfrak{q}}
\end{array}$$

このとき、 $\tilde{\mathfrak{q}} \cap G[a^{-1}]$ は $G[a^{-1}]$ の素イデアルであって \mathfrak{q} に含まれるものに対応しているから、 \mathfrak{q} の極小性より $\tilde{\mathfrak{q}} \cap G[a^{-1}] = \mathfrak{q}$ となっている。ゆえに、単射 $G[a^{-1}]/\mathfrak{q} \hookrightarrow A[a^{-1}]/\tilde{\mathfrak{q}}$ が取れるから、体拡大 $K = \text{Frac}(G[a^{-1}]/\mathfrak{q}) \hookrightarrow L := \text{Frac}(A[a^{-1}]/\tilde{\mathfrak{q}})$ が得られる。ここで、 K の付値環 R について、 $R \subset L$ とみなせるから、これを支配する L の付値環 R' が取れる。すると、 K 上の付値 s' はこの R' に対応する $L = \text{Frac}(A[a^{-1}]/\tilde{\mathfrak{q}})$ 上の付値 $t': L \rightarrow \Gamma_2 \cup \{0\}$ に延長される。すると、

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & s & & \\
& & & & \curvearrowright & & \\
G[a^{-1}] & \longrightarrow & G[a^{-1}]/\mathfrak{q} & \longrightarrow & R & \longrightarrow & K = \text{Frac}(G[a^{-1}]/\mathfrak{q}) \xrightarrow{s'} \Gamma_1 \cup \{0\} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
A[a^{-1}] & \longrightarrow & A[a^{-1}]/\tilde{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & L = \text{Frac}(A[a^{-1}]/\tilde{\mathfrak{q}}) \xrightarrow{t'} \Gamma_2 \cup \{0\} \\
\uparrow & & \uparrow & & \downarrow & & \downarrow \\
A & & & & \uparrow & & \\
& & & & \curvearrowleft & & \\
& & & & t & & \\
& & & & u := t|_A & &
\end{array}$$

という延長ができるので $G[a^{-1}]$ 上の付値 s の $A[a^{-1}]$ への延長 t が取れて、 A への制限を取って A 上の付値 $u := t|_A$ が取れる。まず、 $a^{-1} \in R$ と $t|_R = s|_R$ から $t(a^{-1}) = s(a^{-1}) < 1$ なので $t(a) > 1$ に注意する

と $a \in A \subset A[a^{-1}]$ から $u(a) = t(a)$ なので $u(a) > 1$ となる。さらに任意の $g \in G$ について $G \subset R$ かつ $G \subset A$ から $u(g) = t(g) = s(g) \leq 1$ となる。

ここで、 u について $c\Gamma_u \subset c\Gamma_u$ なので命題 2.14 から $v := u|_{c\Gamma_u}: A \rightarrow c\Gamma_u$ は A 上の付値になる。ここで、 $u(a) > 1$ より $u(a) \in c\Gamma_u$ から $v(a) = u(a) > 1$ となる。さらに任意の $g \in G$ で $v(g) \leq 1$ となる。

$v \in \text{Cont}(A)$ を示す。定理 3.6 から

- (a) $v \in \text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A)$
- (b) $\forall x \in A^{\circ\circ}$ に対して $v(x) < 1$

が示されれば良い。(a) については $\Gamma_v = c\Gamma_u$ であり、任意の $\alpha \in A$ で $u(\alpha) \geq 1$ と $v(\alpha) \geq 1$ が同値であるから、それらを含む最小の凸部分群も同じになるので $c\Gamma_u = c\Gamma_v$ となる。ゆえに $\Gamma_v = c\Gamma_v$ から補題 2.23 より $\Gamma_v = c\Gamma_v(A^{\circ\circ} \cdot A)$ なので $v \in \text{Spv}(A, A^{\circ\circ} \cdot A)$ となる。(b) については任意の $x \in A^{\circ\circ}$ について $n \rightarrow \infty$ で $ax^n \rightarrow 0$ なので G が A で開であることから、ある正整数 n が存在して $ax^n \in G$ となる。ゆえに、示したことから $u(ax^n) \leq 1$ と $v(a) > 1$ より、 $v(x)^n \leq v(a)^{-1} < 1$ となるので $v(x) < 1$ となる。

以上より $v \in \text{Cont}(A)$ となる。よって $v \in \sigma(G)$ であるが、 $v(a) > 1$ から $a \notin \tau \circ \sigma(G)$ より、 a のとり方に矛盾する。ゆえに $G = \tau \circ \sigma(G)$ となる。

以上より σ と τ は互いに逆写像であることがわかり、とくに \mathcal{G}_A と \mathcal{F}_A は包含関係を逆にする一対一対応を持つ。

- (2) $v \in \text{Cont}(A)$ を任意に取る。

$\text{Supp}(v)$ が A で開であるとき。このときは $v/\Gamma_v: A \rightarrow \Gamma_v/\Gamma_v \cup \{0\} = \{0, 1\}$ を取ると、 $v(a) \neq 0$ なら $v/\Gamma_v(a) = 1$ であって、 $v(a) = 0$ なら $v/\Gamma_v(a) = 0$ となる。とくに $\{a \in A \mid v/\Gamma_v(a) < 1\} = \text{Supp}(v)$ は A で開であるので $v/\Gamma_v \in \text{Cont}(A)$ となる。任意の $g \in G$ について $v/\Gamma_v(g) \leq 1$ であるから $v/\Gamma_v \in \sigma(G)$ となる。

$\text{Supp}(v)$ が A で開でないとき。 $A^{\circ\circ}$ は A で開集合であるので、とくに $A^{\circ\circ} \not\subseteq \text{Supp}(v)$ である。よって、ある $a \in A^{\circ\circ}$ が存在して $v(a) > 0$ となる。とくに $v \in \text{Cont}(A)$ から定理 3.6 より $0 < v(a) < 1$ となる。 $H \subset \Gamma_v$ を $v(a) \notin H$ となる Γ_v における最大の凸部分群とすると、 $w(a) \neq 1 \in \Gamma_v/H$ であるから $\Gamma_v/H \cup \{0\} \neq \{1, 0\}$ である。もし Γ_v/H が最小元 γ を持ったとすると、自明な群でないことからとくに $\gamma < 1$ である。すると $\gamma^2 < \gamma$ となり、最小性に反する。したがって Γ_v/H は最小元を持たない。標準的な射を $\pi: \Gamma_v \rightarrow \Gamma_v/H$ とおくと Γ_v/H の任意の元は、ある $\gamma \in \Gamma_v$ によって $\pi(\gamma)$ と書ける。 $0 \neq \delta' < \pi(\gamma)$ が存在していることが、 Γ_v/H が最小元を持たないことからわかり、 $w = \pi \circ v$ となっているので

$$\begin{aligned} \{a \in A \mid w(a) < \pi(\gamma)\} &= \bigcup_{0 \neq \delta' < \pi(\gamma)} \{a \in A \mid w(a) \leq \delta'\} = \bigcup_{0 \neq \pi(\delta) < \pi(\gamma)} \{a \in A \mid w(a) \leq \pi(\delta)\} \\ &\supset \bigcup_{0 \neq \pi(\delta) < \pi(\gamma)} \{a \in A \mid v(a) \leq \delta\} \supset \bigcup_{0 \neq \pi(\delta) < \pi(\gamma)} \{a \in A \mid v(a) < \delta\} \end{aligned}$$

となるから v の連続性からこれは A の開集合になるので w は $\text{Cont}(A)$ に含まれる。

任意の $g \in G$ で $w(g) \leq 1$ となることを示す。もしそうでなかったとすると、ある $g \in G$ で $w(g) > 1$ となるものが取れる。

まず、 $\Gamma_w = \Gamma_v/H$ が階数 1 になることを示す。すなわち、 Γ_v/H は非自明な凸部分群を持たないことを示す。単位群ではない Γ_v/H の凸部分群 \mathcal{H} を任意に取る。すると、この Γ_v への引き戻し $H' := \pi^{-1}(\mathcal{H})$ は H を含む部分群である。さらに $\alpha \in \Gamma_v$ であって、ある $\gamma, \delta \in H'$ によって $\gamma \leq \alpha \leq \delta$ となるとき、 π は順序

を保つので $\mathcal{H} \ni \pi(\gamma) \leq \pi(\alpha) \leq \pi(\delta) \in \mathcal{H}$ となり、 \mathcal{H} は凸部分群であるので $\pi(\alpha) \in \mathcal{H}$ から $\alpha \in H'$ となる。ゆえに $H' = \pi^{-1}(\mathcal{H})$ は Γ_v の凸部分群である。 $\mathcal{H} \neq \{H\} \subset \Gamma_v$ から $H \subsetneq H'$ となる凸部分群であることから、 H の最大性より $v(a) \in H'$ となる。したがって $w(a) \in \mathcal{H}$ である。上で示した w の連続性と $a \in A^\circ$ から注意 3.2 の位相に関して $n \rightarrow \infty$ で $w(a)^n \rightarrow 0 \in \Gamma_v/H$ となるので以下の図のように考える。




図 2: 単位群ではない凸部分群 $\mathcal{H} \subset \Gamma_v/H$ は全体に一致する。

任意の $\gamma \in (0, 1] \subset \Gamma_v/H$ について $[0, \gamma) \subset \Gamma_v/H$ が 0 の開近傍であるので十分大きい正整数 N で $w(a)^N \in [0, \gamma)$ となる。 $w(a)^N \in \Gamma_v/H$ から $w(a)^N \neq 0$ より $w(a)^N \in (0, \gamma)$ なので $w(a)^N < \gamma \leq 1$ より \mathcal{H} が凸部分群であることから $\gamma \in \mathcal{H}$ となる。したがって $(0, 1] \subset \mathcal{H}$ であるから、 \mathcal{H} が群なので $\Gamma_v/H = \mathcal{H}$ である。ゆえに Γ_v/H は非自明な凸部分群は存在しないので階数 1 である。

階数 1 なので $\Gamma_w = \Gamma_v/H$ は \mathbb{R}^+ に埋め込めるから、 $w(a) \neq 0$ と $w(g) > 1$ から十分大きい正整数 n で $w(g^n a) = w(g)^n w(a) > 1$ となる。一方、 $a \in A^\circ$ と $G \subset G^\circ$ から $g \in A^\circ$ と命題 1.15 から A° が A° のイデアルになっていることより $g^n a \in A^\circ$ となる。 $w \in \text{Cont}(A)$ から定理 3.6 より $w(g^n a) < 1$ となるので矛盾する。したがって任意の $g \in G$ で $w(g) \leq 1$ から $w = v/H \in \sigma(G)$ となる。

とくに命題 2.14 より $v \in \overline{\{v/H\}} \subset \overline{\sigma(G)}$ から $\overline{\sigma(G)} = \text{Cont}(A)$ より $\text{Cont}(A)$ で $\sigma(G)$ は稠密である。

(3) 省略。 □

3.2 Huber pair と adic spectrum

$\text{Cont}(A)$ ではなくて、その中の $F \in \mathcal{F}_A$ に制限して考えたい。しかし、 $\text{Cont}(A)$ と十分近いもの考えたいため、 F が $\text{Cont}(A)$ で稠密なものであると良い。これを踏まえて定理 3.10(2) から $G := \tau(F)$ は A° に含まれてほしい。これから、次のような整元環という対象を考える。

定義 3.11 (整元環・Huber pair). A を Huber ring とする。

1. A の開部分環 A^+ が A の中で整閉かつ $A^+ \subset A^\circ$ のとき A^+ を A の整元環 (ring of integral elements) という。 A とその整元環 A^+ の組 (A, A^+) を Huber pair^{*9} という。

2. Huber pair (A, A^+) がそれぞれ adic、Tate、完備であるとは、Huber ring A がそれぞれ adic, Tate, 完備であることである。
3. Huber pair (A, A^+) と (B, B^+) の間の射 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ とは $f: A \rightarrow B$ という環準同型であって $f(A^+) \subset B^+$ となるものである。Huber pair の間の射 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ がそれぞれ連続、adic であるとは $f: A \rightarrow B$ がそれぞれ連続、adic となることである。

scheme 論における環のスペクトラムにあたる、adic 空間を構成するときに張り合わせることになる空間を以下のように定義する。

定義 3.12 (adic spectrum). Huber pair (A, A^+) について定理 3.10 で得られる $\sigma(G) \subset \text{Cont}(A)$ を改めて

$$\text{Spa}(A, A^+) := \{v \in \text{Cont}(A) \mid \forall a \in A^+, v(a) \leq 1\} \quad (3.4)$$

と書き、相対位相を入れて、これを adic spectrum という。

定義 3.13. 連続射 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ について定義 3.3 で得られる $\text{Cont}(f): \text{Cont}(B) \rightarrow \text{Cont}(A)$ によって $f(A^+) \subset B^+$ から制限することで $\text{Spa}(f): \text{Spa}(B, B^+) \rightarrow \text{Spa}(A, A^+)$ を得ることが出来る。

命題 3.14. A を Huber ring とする。 A の部分環 B を $\mathbb{Z} \cdot 1 + A^\circ$ の A における整閉包と定義する。このとき B は A の整元環のなかで最小のものであって、 $\text{Cont}(A) = \text{Spa}(A, B)$ となる。

証明. まず、 $A^\circ \subset B$ から B は A の開部分環であって、整閉包を取っていることから A で整閉なので B は A の整元環になる。 A の任意の整元環 A^+ について、任意の $x \in A^\circ$ に対して A^+ が A で開集合だから、ある正整数 n で $x^n \in A^+$ であって、 A^+ は整閉だから $x \in A^+$ なので $A^\circ \subset A^+$ より $\mathbb{Z} \cdot 1 + A^\circ \subset A^+$ となる。 A^+ は A で整閉だから、両辺の A における整閉包をとれば $B \subset A^+$ となるので B は最小の整元環である。

$\text{Spa}(A, B) \subset \text{Cont}(A)$ は定義から明らか。逆に任意の $v \in \text{Cont}(A)$ をとると、定理 3.6 から任意の $a \in A^\circ$ について $v(a) < 1$ なので強三角不等式を用いて $v(\mathbb{Z} \cdot 1 + A^\circ) \subset (\Gamma_v \cup \{0\})_{\leq 1}$ となる。任意の B の元 b は $\mathbb{Z} \cdot 1 + A^\circ$ 上整なので、ある $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z} \cdot 1 + A^\circ$ が存在して $b^n + \alpha_{n-1}b^{n-1} + \dots + \alpha_1b + \alpha_0 = 0$ となる。ゆえに上で示したことと合わせて

$$v(b)^n = v(-\alpha_{n-1}b^{n-1} - \dots - \alpha_1b - \alpha_0) \leq \max\{v(b)^k v(\alpha_k) \mid k = 0, \dots, n-1\} \leq \max\{v(b)^k \mid k = 0, \dots, n-1\} \quad (3.5)$$

より、ある正整数 m で $v(b)^m \leq 1$ なので $v(b) \leq 1$ である。よって $v \in \text{Spa}(A, B)$ から $\text{Cont}(A) \subset \text{Spa}(A, B)$ となるのでこれらの集合は一致する。□

定義 2.26 をあらためて $\text{Spa}(A, A^+)$ において定義する。

*9 [Hu93] では、この組を affinoid ring と呼んでいる。

定義 3.15 (有理集合). Huber pair (A, A^+) をとる。 A の有限集合 T_1, \dots, T_n であって $T_i \cdot A$ が A で開集合であるものとする。さらに A の元 s_1, \dots, s_n を任意に取る。このとき $\text{Spa}(A, A^+)$ の部分集合を

$$R\left(\frac{T_1}{s_1}, \dots, \frac{T_n}{s_n}\right) := \bigcap_{i=1}^n \{v \in \text{Spa}(A, A^+) \mid \forall t \in T_i, v(t) \leq v(s_i) \neq 0\} \quad (3.6)$$

と定義する。これを $\text{Spa}(A, A^+)$ の**有理集合 (rational subset)** という。とくに定義 2.7 の位相の入れ方から有理集合はすべて $\text{Spa}(A, A^+)$ の開集合になる。

事実 2.29 と同様のことが $\text{Spa}(A, A^+)$ についても成り立つ。

事実 3.16 ([Hu93] Theorem 3.5). Huber pair (A, A^+) について次が成り立つ。

1. $\text{Spa}(A, A^+)$ は spectral space である。
2. $\text{Spa}(A, A^+)$ において有理集合全体は開基になる。さらに、有理集合は $\text{Spa}(A, A^+)$ で構成可能集合である。(とくに有理集合は quasi-compact である)
3. $\text{Spa}(A, A^+)$ の有理集合 U は、ある A の元 s と有限集合 $T \subset A$ で $T \cdot A$ が A で開になるものが存在して、 $U = R(T/s)$ となる。

注意 3.17. とくに Tate な Huber pair (A, A^+) について事実 3.16(3) から、 $\text{Spa}(A, A^+)$ の任意の有理集合は、ある $s, t_1, \dots, t_r \in A$ で $(t_1, \dots, t_r) = A$ となるものが存在して $R(\{t_1, \dots, t_r\}/s)$ と表せる。

3.3 analytic point

$\text{Spa}(A, A^+)$ の点に関する良い性質として次の「解析的」というものがある。

定義 3.18 (解析的). $\text{Spa}(A, A^+)$ の元 x が**解析的 (analytic)** であるとは、 A の素イデアル $\text{Supp}(x)$ が A で開集合ではないことである。解析的でない点を**非解析的 (non-analytic)** であるという。

このとき $\text{Spa}(A, A^+)_a$ によって、 $\text{Spa}(A, A^+)$ の解析的な点全体の集合を表し、非解析的な点全体を $\text{Spa}(A, A^+)_{na}$ と表す。とくに同様にして $\text{Cont}(A)_a$ なども定義する。

解析的という性質は「解析的」という言葉に即した形で次のように言い換えることも出来る。

命題 3.19. $x \in \text{Spa}(A, A^+)$ について次は同値である。

1. x は非解析的である。
2. $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ で 0 は孤立点になる。

非解析的であることは解析的でないことであり、孤立点であることは集積点でないことであるので次は同値である。

1. x は解析的である。
2. $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ で 0 は集積点になる。

証明. $x \in \text{Spa}(A, A^+)$ が非解析的であるとは、 $\text{Supp}(x)$ が $\text{Spa}(A, A^+)$ で開集合となっていることから、以下の図のように、 $0 \in A$ を覆うような開近傍として $\text{Supp}(x)$ を取り除くことができる。すると $A \setminus \text{Supp}(x)$ は閉なので、 $\text{Supp}(x)$ の外側から $0 \in (A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ に近づくことができないから、 0 は $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ で孤立点になる。




図 3: 非解析的な点 x について $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ で $\{0\}$ は孤立点になる。

逆を示すためには対偶を考えて、解析的であるなら 0 が集積点になることを示せば良い。 A の定義イデアル I を一つ固定する。 x が解析的だから、 $\text{Supp}(x)$ が開ではないので、任意の正整数 n について $I^n \not\subseteq \text{Supp}(x)$ となっている。すると、正整数 n について $I^n \setminus \text{Supp}(x) \neq \emptyset$ から、以下の図のように $\text{Supp}(x)$ 外側から $0 \in (A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ に近づくことが出来る。故に 0 は $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ において集積点になっている。




図 4: 解析的な点 x について $(A \setminus \text{Supp}(x)) \cup \{0\}$ で $\{0\}$ は集積点になる。

□

命題 3.20. Huber pair (A, A^+) の解析的点と非解析的点について次が成り立つ。

1. $\text{Spa}(A, A^+)_a$ は $\text{Spa}(A, A^+)$ の開集合である。とくに $\text{Spa}(A, A^+)_{na}$ は $\text{Spa}(A, A^+)$ の閉集合になる。
2. A が Tate のときは $\text{Spa}(A, A^+) = \text{Spa}(A, A^+)_a$ となる。
3. A が離散環のときは $\text{Spa}(A, A^+) = \text{Spa}(A, A^+)_{na}$ となる。

証明. (1) A の定義イデアル I とその有限個からなる生成系 T を取る。とくに $I \subset T \cdot A$ より $T \cdot A$ は A の開集合である。このとき、 $v \in \text{Spa}(A, A^+)$ について $\text{Supp}(v)$ が A の素イデアルであることに注意すると

$$\text{Supp}(v) \in \text{Spa}(A, A^+)_{na} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{Z}^+, I^n \subset \text{Supp}(v) \Leftrightarrow I \subset \text{Supp}(v) \Leftrightarrow \forall t \in T, v(t) = 0 \quad (3.7)$$

であるから、

$$\text{Spa}(A, A^+)_a = \{v \in \text{Spa}(A, A^+) \mid \exists t \in T, v(t) \neq 0\} \quad (3.8)$$

となる。 T が有限集合だから $\{v(t) \mid t \in T\}$ の中の最大元を考えることで、 $\text{Spa}(A, A^+) = \cup_{t \in T} R(T/t)$ となるから解析的点全体は $\text{Spa}(A, A^+)$ で開集合になる。 $\text{Spa}(A, A^+)_{na} = \text{Spa}(A, A^+) \setminus \text{Spa}(A, A^+)_a$ より非解析的点全体は閉集合になる。

(2) $\text{Supp}(v)$ が A で開であるとき、ある pseudo-uniformizers $s \in A^\times$ が存在して $s \in \text{Supp}(v)$ となるから、 $\text{Supp}(v) = A$ となって、素イデアルであることに反する。ゆえに、 $\text{Supp}(v)$ が開であるような $v \in \text{Spa}(A, A^+)$ は存在しないので $\text{Spa}(A, A^+) = \text{Spa}(A, A^+)_{na}$ となる。

(3) 任意の $v \in \text{Spa}(A, A^+)$ に対して、離散位相であることから $\text{Supp}(v)$ は A の開集合であるので v は非解析的である。 □

$\text{Spa}(A, A^+)_a$ における specialization は次のようにわかりやすい形になる。

命題 3.21. $\text{Spa}(A, A^+)_a$ の点は $\text{Spa}(A, A^+)_a$ において真の horizontal specialization を持たない。すなわち、ある Γ_v の $c\Gamma_v$ を含む凸部分群 H によって得られる $v|_H$ が $\text{Spa}(A, A^+)_a$ に含まれるとき、 $v = v|_H$ となる。 $(H = \Gamma_v$ となるということ) とくに事実 2.16 から、 $\text{Spa}(A, A^+)_a$ の中での specialization は vertical specialization のみである。

証明. ある Γ_v の $c\Gamma_v$ を含む凸部分群 H による $v|_H \in \text{Spa}(A, A^+)$ をとる。 $\text{Supp}(v|_H) = \{a \in A \mid v|_H(a) = 0\} = \{a \in A \mid v(a) \notin H\}$ である。ここで、 $H \neq \Gamma_v$ とすると $\gamma \in \Gamma_v \setminus H$ という元が取れる。必要なら $\gamma^{-1} \in \Gamma_v \setminus H$ に取り替えることで $\gamma < 1$ としてよい。任意の $v(a) < \gamma$ となる $a \in A$ について、もし $a \notin \text{Supp}(v|_H)$ となったとすると $v(a) \in H$ から、 $H \ni v(a) < \gamma < 1 \in H$ となり、 H が凸部分群なので $\gamma \in H$ となるが、これは γ のとり方に矛盾する。ゆえに $a \in \text{Supp}(v|_H)$ から $\{a \in A \mid v(a) < \gamma\} \subset \text{Supp}(v|_H)$ であり、 v の連続性から $\{a \in A \mid v(a) < \gamma\}$ は $0 \in A$ の開近傍なので、それを含む $\text{Supp}(v|_H)$ は A の開集合である。ゆえに $v|_H \in \text{Spa}(A, A^+)_{na}$ であるから、 $v|_H \in \text{Spa}(A, A^+)_a$ なら $H = \Gamma_v$ なので $v|_H = v$ となるから、 v は $\text{Spa}(A, A^+)_a$ の中で真の horizontal specialization を持たない。 □

命題 3.22. 任意の $x \in \text{Spa}(A, A^+)_a$ について $\text{rank}(\Gamma_x) \geq 1$ である。さらに、「 $\text{rank}(\Gamma_x) = 1 \iff x$ は $\text{Spa}(A, A^+)_a$ で maximal point ^{*10}」が成り立つ。

証明. 対偶を示す。 $\text{rank}(\Gamma_x) = 0$ は $\Gamma_x = \{1\}$ ということなので、 $x: A \rightarrow \{0, 1\}$ となっている。 x の連続性から $\{a \in A \mid x(a) < 1\} = \text{Supp}(x)$ は A の開集合であるので $x \in \text{Spa}(A, A^+)_{na}$ である。

必要十分条件を示す。 $\text{Spa}(A, A^+)_a$ の中で $x \in \overline{\{y\}}$ となったとすると、 x は y の specialization なので、命題 3.21 より x は y の vertical specialization だから、ある凸部分群 $H \subset \Gamma_v$ で $y = x/H$ となる。ここで、 $\text{rank}(\Gamma_x) = 1$ は Γ_x の凸部分群 H は $H = \{1\}$ または $H = \Gamma_x$ のみであることであるから、 $y = x/H$ の H について $H = \{1\}$ または $H = \Gamma_x$ となる。もし $H = \Gamma_x$ となったとすると $y: A \rightarrow \{0, 1\}$ なので、最初の証明と同様に $y \notin \text{Spa}(A, A^+)_a$ となるので $\text{Spa}(A, A^+)_a$ における x の specialization になっていないから $y = x/\{1\} = x$ となるので x は maximal point である。逆に、任意の Γ_x の凸部分群 H について x の specialization x/H は $\text{Supp}(x/H) = \text{Supp}(x) \in \text{Spa}(A, A^+)_a$ より、仮定から $x/H = x$ となる。ゆえに H は 1 以外に元を含んではならないため、 $H = \{1\}$ だから $\text{rank}(\Gamma_x) = 1$ となる。□

環のスペクトラムが空集合であるための必要十分条件と同様のことが adic spectrum について成り立つ。

命題 3.23. (A, A^+) を Huber pair とする。 A のある定義イデアル I を固定すると $\overline{\{0\}} = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} I^n$ より、 $\overline{\{0\}}$ は A のイデアルになっている。よって、剰余環 $A/\overline{\{0\}}$ が定義できて、これに $A \rightarrow \overline{\{0\}}$ による商位相を入れることで $A/\overline{\{0\}}$ は Huber ring になる。このとき次が成り立つ。

1. $\text{Spa}(A, A^+) = \emptyset \iff A/\overline{\{0\}} = 0$.
2. $\text{Spa}(A, A^+)_a = \emptyset \iff A/\overline{\{0\}}$ が離散環になる。

証明. (\Leftarrow) $\overline{\{0\}} \subset A^\circ \subset A^+$ より、 $A/\overline{\{0\}}$ の整元環として $A^+/\overline{\{0\}}$ が取れる。そこで、 $A \rightarrow A/\overline{\{0\}}$ から得られる次の写像

$$\text{Spa}(A/\overline{\{0\}}, A^+/\overline{\{0\}}) \longrightarrow \text{Spa}(A, A^+) \quad (3.9)$$

$$v \longmapsto (A \rightarrow A/\overline{\{0\}} \xrightarrow{v} \Gamma_v \cup \{0\}) \quad (3.10)$$

を考える。ここで、 $v \in \text{Spa}(A, A^+)$ の連続性から $v(I)^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ より $v(\overline{\{0\}}) = 0$ となるから、この写像は全単射になる。したがって、零環は付値を持たないことと、命題 3.20(3) より、離散環は解析的点を持たないことから、(1) と (2) の (\Leftarrow) の方向は成り立つことがわかる。

(1) (\Rightarrow) (2) を用いて示す。 $\text{Spa}(A, A^+) = \emptyset$ なら、とくに $\text{Spa}(A, A^+)_a = \emptyset$ なので (2) より $A/\overline{\{0\}}$ は離散的である。とくに商位相を入れているから $\overline{\{0\}}$ は A の開集合になる。もし $A/\overline{\{0\}}$ が素イデアル \mathfrak{p} を持ったとすると、

^{*10} 真の genrization を持たないこと。すなわち、 x が maximal point であるとは $x \in \overline{\{y\}}$ ならば $x = y$ となること。これは環のスペクトラムにおいては極小素イデアルと対応する。

$$v: A \longrightarrow A/\overline{\{0\}} \longrightarrow (A/\overline{\{0\}})/\mathfrak{p} \longrightarrow \text{Frac}((A/\overline{\{0\}})/\mathfrak{p}) \longrightarrow \{0, 1\} \quad (3.11)$$

$$a \longmapsto \begin{cases} 0 & (a = 0) \\ 1 & (a \neq 0) \end{cases} \quad (3.12)$$

として A 上の付値 v を定義できる。とくに $\Gamma_v \cup \{0\} = \{0, 1\}$ より $v(A^+) \leq 1$ である。さらに、 $\gamma \in \Gamma_v = \{1\}$ から、 $\{a \in A \mid v(a) < \gamma = 1\} = \text{Supp}(v) = \overline{\{0\}}$ は A で開集合だったので v は連続でもあるから $v \in \text{Spa}(A, A^+)$ となる。これは $\text{Spa}(A, A^+) = \emptyset$ という仮定に矛盾しているので $A/\overline{\{0\}}$ は素イデアルを持たない。ゆえに $A/\overline{\{0\}} = 0$ となる。

(2)(\Rightarrow) A の定義環 B とその定義イデアル $I \subset B$ を一つ固定する。まず次を示す。

(a) $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(B)$ について、ある $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ で $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ かつ $I \subset \mathfrak{q}$ のとき、 $I \subset \mathfrak{p}$ となる。^{*11}

(a) を示す。

$I \not\subset \mathfrak{p}$ なら $\text{Spa}(A, A^+)_a \neq \emptyset$ となることを示せば良い。定理 3.10(1) の証明のように付値を構成していく。まず、 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(B)$ について $K := \text{Frac}(B/\mathfrak{p})$ をとる。すると、 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ より、 K 中の局所環 $(B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}/\mathfrak{p}}$ について、ある K 上の付値 u で $(B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}/\mathfrak{p}}$ を支配するものが存在する。すなわち、 u の K における付値環 R とその極大イデアル \mathfrak{m} について $(B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}/\mathfrak{p}} \subset R$ かつ $\mathfrak{q}/\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ となる。 $B \rightarrow B/\mathfrak{p} \rightarrow \text{Frac}(B/\mathfrak{p}) = K \xrightarrow{u} \Gamma_u \cup \{0\}$ による B 上の付値も以下のように同様に u と書くことにする。

$$\begin{array}{ccccccc} B & \longrightarrow & B/\mathfrak{p} & \hookrightarrow & (B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}/\mathfrak{p}} & \xrightarrow{\text{dominant}} & R \\ & & & & & \searrow & \downarrow \\ & & & & & & K = \text{Frac}(B/\mathfrak{p}) & \xrightarrow{u} & \Gamma_u \cup \{0\} \\ & \searrow & & & & & & \nearrow & \\ & & & & & & & & \end{array}$$

u

とくに $\text{Supp}(u) = \mathfrak{p} \subset B$ となる。ここで、定義イデアルとして取ってきた I について定義 2.25 で定義したレトラクション $r: \text{Spv}(B) \rightarrow \text{Spv}(B, I)$ によって $r(u) = u|_{c\Gamma_u(I)} \in \text{Spv}(B, I)$ をとる。

- (i) $r(u)$ は B 上の連続付値である。
- (ii) $\text{Supp}(r(u))$ は A で開集合ではない。

が成り立つことを示す。

(i) 定理 3.6 を adic ring である B に適用して、任意の $b \in B^\circ$ で $v(b) < 1$ であることと、 $v \in \text{Spv}(B, B^\circ \cdot B)$ であることを示せば良い。まず、 $B^\circ = \sqrt{I}$ であることから、任意の $b \in B^\circ$ について、ある正整数 n が存在して $b^n \in I$ となる。すると、仮定から $I \subset \mathfrak{q}$ であり、 u の定義から $\mathfrak{q}/\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m} \subset R$ だったので I の K への像は \mathfrak{m} に含まれるから、 $u(b^n) < 1$ となるので $u(b) < 1$ となる。 $r(u) = u|_{c\Gamma_u(I)}$ より、 $r(u)(b) < 1$ なので、任意の $b \in B^\circ$ で $v(b) < 1$ であることは成り立つ。 $v \in \text{Spv}(B, B^\circ \cdot B) = \text{Spv}(B, \sqrt{I})$ を示す。まず、 $r(u) \in \text{Spv}(B, I)$ であるので $\Gamma_{r(u)} = c\Gamma_{r(u)}(I)$ であることから、補題 2.23 より、 $\Gamma_{r(u)} = c\Gamma_{r(u)}$ または、任意の $i \in I$ について $r(u)(i)$ は $\Gamma_{r(u)}$ で cofinal になる。ここで、もし $\Gamma_{r(u)} \neq c\Gamma_{r(u)}(I)$ であったとすると任意の $i \in \sqrt{I}$ についてある正整数 n が存在して $i^n \in I$ であるから、任意の $\gamma \in \Gamma_{r(u)}$ についてある正整

^{*11} 幾何学的には $V(I)$ は $V(I)$ が接している $\text{Spec}(B)$ の既約集合を含むということである。すなわち $V(I) \cap V(\mathfrak{p}) \Rightarrow V(I) \supset V(\mathfrak{p})$ ということ。この解釈は [Con] Proposition 11.6.1 に記載されている。

数 m が存在して $r(u)(i^n)^m = r(u)(i)^{nm} < \gamma$ となる。ゆえに $i \in \sqrt{I}$ について $r(u)(i)$ は $\Gamma_{r(u)}$ で cofinal となるから $\Gamma_{r(u)} = c\Gamma_{r(u)}(\sqrt{I})$ となる。したがって、 $r(u) \in \text{Cont}(B)$ となる。

(ii) 背理法の仮定から $I \not\subseteq \mathfrak{p}$ であるから、ある $a \in I \setminus \mathfrak{p}$ で $u(a) \neq 0$ より $u(I) \neq \{0\}$ となる。事実 2.29(4) から $r(u)(I) \neq \{0\}$ である。もし任意の $a \in I \setminus \mathfrak{p}$ で $r(u)(a) = 0$ となったとすると、 $\mathfrak{p} = \text{Supp}(u)$ から $r(u)(\mathfrak{p}) = \{0\}$ より $r(u)(I) = \{0\}$ となり、矛盾する。したがってある $a \in I \setminus \mathfrak{p}$ で $r(u)(a) \neq 0$ となるものが取れる。すると、 $a \in I$ かつ $a \notin \text{Supp}(r(u))$ なので $I \not\subseteq \text{Supp}(r(u))$ となる。 $\text{Supp}(r(u))$ が A の素イデアルであることから、任意の正整数 n で $I^n \not\subseteq \text{Supp}(r(u))$ となる。ゆえに $\text{Supp}(r(u))$ は A で開集合ではない。

以上より、 $r(u) \in \text{Cont}(B)_a$ である。後の補題 3.24(iii) から、ある $v \in \text{Cont}(A)_a$ が存在して $v|_B = r(u)$ となるものが取れる。この $v \in \text{Cont}(A)_a$ について、定理 3.10(ii) を $G = A^+$ に適用すれば、ある v の vertical specialization である w で $\text{Spa}(A, A^+)$ に含まれるものが存在する。とくに vertical specialization なので $\text{Supp}(v) = \text{Supp}(w)$ なので $w \in \text{Spa}(A, A^+)_a$ となる。しかしこれは $\text{Spa}(A, A^+)_a = \emptyset$ に矛盾している。 $r(u)$ を解析的になるようにしていた $I \not\subseteq \mathfrak{p}$ が矛盾を生じさせていたため、 $I \subset \mathfrak{p}$ となる。以上で (a) を示すことができた。以上の議論は次の図のようになる。




図 5: $\text{Supp}(u) = \mathfrak{p}$ となる付値 u から $\text{Spa}(A, A^+)_a$ に入る付値 w を取ることが出来る。

以上を踏まえて $A/\{0\}$ が離散環であることを示す。ここで、局所化の射 $\varphi: B \rightarrow (1+I)^{-1}B =: C$ は [AM] exercise 3.2 より $\varphi(I)C$ は C のジャコブソン根基 $\text{Jac}(C)$ に含まれる。ゆえに、任意の $\mathfrak{p}' \in \text{Spec}(C)$ について $V(\mathfrak{p}')$ は C のある極大イデアルを含み、 $\varphi(I)C$ は C の任意の極大イデアルに含まれているから、 $V(\varphi(I)C) \cap V(\mathfrak{p}') \neq \emptyset$ となる。すると、 C と B のイデアルの対応定理から、とくに $\mathfrak{q}' \in \text{Spec}(B)$ が存在して $\varphi(\mathfrak{q}')C = \mathfrak{p}'$ となり、 $\text{Spec}(B)$ において $V(I) \cap V(\mathfrak{q}') \neq \emptyset$ となる。上で示した (a) から、 $I \subset \mathfrak{q}'$ であるので $\varphi(I)C \subset \mathfrak{p}'$ となる。ゆえに任意の C の素イデアルに $\varphi(I)C$ が含まれるので $\varphi(I)C \subset \text{Nil}(C)$ となる。 I は有限生成なので $\varphi(I)C$ も有限生成だから十分大きい正整数 N によって $\varphi(I^N)C = 0$ となる。 I^N の有限個からなる生成系 $\{x_j\}_{j \in J}$ について、 $\varphi(x_j) = 0 \in C = (1+I)^{-1}B$ であるので、ある I の元 i_j が存在して $(1+i_j)x_j = 0$ となる。有限積 $\prod_{j \in J} (1+i_j) \in 1+I$ を取ると、ある $i \in I$ で $1+i$ と表すことが

できて、 $(1+i)x_j = 0$ から $(1+i)I^N = 0$ より $I^N = i \cdot I^N \subset I^{N+1} \subset I^N$ なので $I^N = I^{N+1}$ となる。ゆえに $\overline{\{0\}} = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} I^n = I^N$ となるので A で開集合になっているから、商位相を考えれば $A/\overline{\{0\}}$ において $0 \in A/\overline{\{0\}}$ は開集合になっている。ゆえに $A/\overline{\{0\}}$ は離散環になることが示された。□

上記命題 3.23(ii) の証明で用いた補題を示す。この補題によって、とくにもとの環とその開部分環の解析的点同士がよい対応をしていることがわかる。

補題 3.24. A を Huber ring とし、 B を A の開部分環とする。 $g: \text{Spv}(A) \rightarrow \text{Spv}(B)$ を包含 $B \subset A$ から定義 2.12 によって得られる写像とし、 $f: \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ を包含 $B \subset A$ から得られる環のスペクトラムの間の写像とする。このとき次の図式

$$\begin{array}{ccc} \text{Spv}(A) & \xrightarrow{g} & \text{Spv}(B) \\ \downarrow \text{Supp} & & \downarrow \text{Supp} \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \text{Spec}(B) \end{array}$$

は可換である。開である B の素イデアル全体の集合を $T \subset \text{Spec}(B)$ とするとき、次が成り立つ。

1. $f^{-1}(T) \subset \text{Spec}(A)$ は A の開素イデアル全体の集合と一致し、 f から誘導される写像 $\text{Spec}(A) \setminus f^{-1}(T) \rightarrow \text{Spec}(B) \setminus T$ は同相写像になる。
2. $\text{Cont}(A) = g^{-1}(\text{Cont}(B))$ となる。すなわち、定義 3.13 で定義される $g|_{\text{Cont}(A)}$ は全射になる。
3. $g|_{\text{Cont}(A)_a}: \text{Cont}(A)_a \rightarrow \text{Cont}(B)$ は $\text{Cont}(A)_a \rightarrow \text{Cont}(B)_a$ を誘導し、これは同相になる。さらに $x \in \text{Cont}(A)_a$ について自然に定まる群準同型 $\Gamma_{g(x)} \rightarrow \Gamma_x$ は同型写像になる。

証明. A のある定義環の定義イデアル I を一つ固定する。

(1) $\mathfrak{p} \in f^{-1}(T)$ をとると、 f の定義から $f(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p} \cap B \in T$ であるので、 $\mathfrak{p} \cap B$ は B の開素イデアルになる。ゆえに、ある正整数 n が存在して $I^n \subset \mathfrak{p} \cap B \subset \mathfrak{p}$ であるので \mathfrak{p} は A で開である。さらに、 A の素イデアル \mathfrak{p} が開集合であったとすると、 $f(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p} \cap B$ は B の中で開集合になる。ゆえに $f^{-1}(T)$ は A の開素イデアル全体の集合に一致する。

同相になることを示す。 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B) \setminus T$ を取ると、開集合である。ここで、 $B^{\circ\circ} = A^{\circ\circ} \cap B$ が B で開集合より、非アルキメデスの位相環であることから、 \mathfrak{q} は $B^{\circ\circ}$ を含むことはない。したがって、ある $s \in B^{\circ\circ}$ で $s \notin \mathfrak{q}$ となるものが取れるので $\mathfrak{q} \in D(s) \subset \text{Spec}(B)$ となっている。逆に、ある $s \in B^{\circ\circ}$ で $s \notin \mathfrak{q}$ となる B の素イデアル \mathfrak{q} が開素イデアルになったとする。 $s^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ であるのである正整数 n で $s^n \in \mathfrak{q}$ であり、素イデアルであることから $s \in \mathfrak{q}$ となり矛盾する。ゆえに $\text{Spec}(B) \setminus T = \bigcup_{s \in B^{\circ\circ}} D(s)$ となっている。また、自然に定まる $B_s \rightarrow A_s$ が同型になることを示す。実際、任意の $a \in A$ について、 $as^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ であるから、 B が A で開集合になっているので、ある正整数 n で $as^n \in B$ となる。ゆえに、任意の $a/s^m \in A_s$ について $s^n a/s^{m+n} \in B_s$ が取れて、これは a/s^m に移るので $B_s \rightarrow A_s$ は全射。また、もし $b/s^m \in B_s$ が A_s で 0 に移ったとすると、ある正整数 n で $bs^n = 0 \in A$ となるから、 $b/s = bs^n/s^{n+m} = 0 \in B_s$ であるので $B_s \rightarrow A_s$ は単射。以上より、 $B_s \rightarrow A_s$ は同型であり、これは同相 $\text{Spec}(A) \supset D(s) \rightarrow D(s) \subset \text{Spec}(B)$ を誘導する。以上より

$$\text{Spec}(A) \setminus f^{-1}(T) = \bigcup_{s \in B^{\circ\circ}} D(s) \xrightarrow{\cong} \bigcup_{s \in B^{\circ\circ}} D(s) = \text{Spec}(B) \setminus T \quad (3.13)$$

から、求める同相が得られる。

(3) (2)の前に(3)を示す。 $g|_{\text{Cont}(A)_a}$ も簡単のため g と表すことにする。まず $g(\text{Cont}(A)_a) \subset \text{Cont}(B)_a$ を示す。任意の $x \in \text{Cont}(A)$ について $g(x) = x|_B$ が連続であることを示す。まず、 x は A 上連続であるから、任意の $\gamma \in \Gamma_x$ について $\{a \in A \mid x(a) < \gamma\}$ は A の開集合になっている。ゆえに $\{b \in B \mid g(x)(b) < \gamma\} = \{b \in B \mid x(b) < \gamma\} = \{a \in A \mid x(a) < \gamma\} \cap B$ であり、これは B で開集合になっているから $g(x)$ は B で連続となるので $g(\text{Cont}(A)) \subset \text{Cont}(B)$ となる。とくに $x \in \text{Cont}(A)_a$ のとき、解析的であることから、 $\text{Supp}(x)$ は A の素イデアルであるが、開集合ではない。したがって(1)より $\text{Supp}(x) \in f^{-1}(T)$ である。ゆえに f と g の定義から $\text{Supp}(g(x)) = \text{Supp}(x|_B) = B \cap \text{Supp}(x)$ となり、 $f(\text{Supp}(x)) \in T$ となり、 $g(x)$ も解析的になるので $g(\text{Cont}(A)_a) \subset \text{Cont}(B)_a$ となっている。

$g: \text{Cont}(A)_a \rightarrow \text{Cont}(B)_a$ が同相になっていることを示す。まず g が単射になることを示す。より一般に $x \in \text{Cont}(A)_a$ と $y \in \text{Spv}(A)$ が $g(x) = g(y)$ となったとする。ここで $\text{Supp}(x)$ は A で開集合ではないので $B^{\circ\circ} \not\subset \text{Supp}(x)$ から、ある $b \in B^{\circ\circ}$ であって、 $x(b) \neq 0$ となるものが存在する。すると、任意の $a \in A$ について $ab^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ より、ある正整数 n が存在して $ab^n \in B$ となる。ゆえに $x|_B = g(x) = g(Y) = y|_B$ から、 $x(a) = x(a)x(b)^n x(b)^{-n} = x(ab^n)x(b)^{-n} = y(ab^n)y(b)^{-n} = y(a)$ より $x = y$ となる。 $g: \text{Cont}(A)_a \rightarrow \text{Cont}(B)_a$ が全射になることを示す。任意の $y \in \text{Cont}(B)_a$ をとる。解析的であることから、 $\text{Supp}(y) \in \text{Spec}(B) \setminus T$ になり、(1)の同相 $\text{Spec}(A) \setminus f^{-1}(T) \rightarrow \text{Spec}(B) \setminus T$ より、ある $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \setminus f^{-1}(T)$ であって $\mathfrak{p} \cap B = \text{Supp}(y)$ となるものが存在する。ここで、命題 2.5 から、 $K(x) = \text{Frac}(B/\text{Supp}(x))$ 上の付値が得られて、これも y と表すことにする。 $\mathfrak{p} \cap B = \text{Supp}(y)$ から、単射 $B/\text{Supp}(y) \rightarrow A/\mathfrak{p}$ を得る。それより、以下の可換図式を得る。とくに付値の一般論 ([Mor] Proposition I.1.2.3) より y を延長する $K(x) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上の付値 x が取れる。

$$\begin{array}{ccccc} A/\mathfrak{p} & \longrightarrow & \text{Frac}(A/\mathfrak{p}) & \xrightarrow{x} & \Gamma_x \cup \{0\} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B/\text{Supp}(y) & \longrightarrow & K(y) & \xrightarrow{y} & \Gamma_y \cup \{0\} \end{array}$$

このとき、 $A \rightarrow A/\mathfrak{p} \rightarrow K(x) = \text{Frac}(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{x} \Gamma_x \cup \{0\}$ によって A 上の付値が得られて、これも同じく $x \in \text{Spv}(A)$ と表す。とくに y の延長であることから $g(x) = x|_B = y$ となるものが取れる。 $y \in \text{Cont}(A)_a$ を示す。実際、任意の $\gamma \in \Gamma_x \cup \{0\}$ について $x|_B = y$ から

$$\{a \in A \mid x(a) < \gamma\} \cap \{b \in B \mid x(b) < \gamma\} = \{b \in B \mid y(b) < \gamma\} \quad (3.14)$$

で $y \in \text{Cont}(B)$ より $\{b \in B \mid y(b) < \gamma\}$ は B で開集合になる。 B は A で開集合なので $\{b \in B \mid y(b) < \gamma\}$ は A においても開集合になる。よって $\{a \in A \mid x(a) < \gamma\}$ も A で開集合だから $x \in \text{Cont}(A)$ となる。さらに、 x の構成から $\text{Supp}(x) = \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \setminus f^{-1}(T)$ より開集合にならないので $x \in \text{Cont}(A)_a$ となる。したがって $g(x) = y$ と合わせて全射になるから、以上より $g: \text{Cont}(A)_a \rightarrow \text{Cont}(B)_a$ は全単射。

g は既に連続なので開写像になることを示す。とくに $a, b \in A$ によって定義される開基 $\{v \in \text{Cont}(A)_a \mid v(a) \leq v(b) \neq 0\}$ の g による像が開集合になることを示せばいい。この開基の元 v について、解析的であるから $\text{Supp}(v)$ は開集合にならないので、ある $\beta \in B^{\circ\circ} \setminus \text{Supp}(v)$ が取れる。 $n \rightarrow \infty$ で $a\beta^n \rightarrow 0$ かつ $b\beta^n \rightarrow 0$ であるので B が A で開集合なので、ある正整数 N で $a\beta^N, b\beta^N \in B$ となる。さらに、 $\beta \notin \text{Supp}(v)$ かつ $v(b) \neq 0$ から $b \notin \text{Supp}(v)$ で $\text{Supp}(v)$ が A の素イデアルであることから $b\beta^N \notin \text{Supp}(v)$ となっている。ゆ

えに $v|_B(a\beta^N) \leq v|_B(b\beta^N) \neq 0$ となる。ゆえに全単射性と合わせて

$$g(\{v \in \text{Cont}(A)_a \mid v(a) \leq v(b) \neq 0\}) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} \bigcup_{\beta \in B^{\circ\circ}} \{u \in \text{Cont}(B)_a \mid u(a\beta^n) \leq u(b\beta^n) \neq 0\} \quad (3.15)$$

より g は開写像になるので g は同相になる。

次に任意の $x \in \text{Cont}(A)_a$ について群同型 $\Gamma_{g(x)} \rightarrow \Gamma_x$ が得られることを示す。 g の全単射性から、 g の全射性を示したときの $y \in \text{Cont}(B)_a$ とその延長 $x \in \text{Cont}(A)_a$ について得られた図式について、 $\Gamma_x = \Gamma_y$ となることを示せばよい。とくに、 $K(y) = K(x)$ となることを示す。 $B \subset A$ と $\text{Supp}(y) = \mathfrak{p} \cap B$ より準同型 $B_{\text{Supp}(y)} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ が取れる。これが同型になることを示す。 $b/s, c/t \in B_{\text{Supp}(y)}$ について $b/s = c/t \in A_{\mathfrak{p}}$ となったとすると、ある $u \in A \setminus \mathfrak{p}$ が存在して $(bt - cs)u = 0$ となる。 \mathfrak{p} は開集合ではなかったから、ある $\alpha \in A^{\circ\circ} \setminus \mathfrak{p}$ が取れて、ある正整数 n で $u\alpha^n \in B$ となる。とくに $u, \alpha \notin \mathfrak{p}$ から $u\alpha^n \notin \mathfrak{p}$ であるので $u\alpha^n \in B \setminus (B \cap \mathfrak{p}) = B \setminus \text{Supp}(y)$ となる。ゆえに $(bt - cs)u\alpha^n = 0$ と合わせて $b/t = c/s \in B_{\text{Supp}(y)}$ となるので $B_{\text{Supp}(y)} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ は単射になる。また、任意の $a/s \in A_{\mathfrak{p}}$ について上と同様に $\alpha \in A^{\circ\circ} \setminus \mathfrak{p}$ であって、ある正整数 n で $s\alpha^n \in B$ かつ $a\alpha^n \in B$ となるものが取れる。さらに、 $s, \alpha \notin \mathfrak{p}$ と $\text{Supp}(y) = B \cap \mathfrak{p}$ から $s\alpha^n \notin \mathfrak{p}$ である。ゆえに $s\alpha^n \in B \setminus \text{Supp}(y)$ となる。したがって $a\alpha^n/s\alpha^n \in B_{\text{Supp}(y)}$ が取れて、これは $A_{\mathfrak{p}}$ で a/s に移るので $B_{\text{Supp}(y)} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ は全射。以上より、これは同型になる。

これより、単射 $K(y) \rightarrow K(x)$ は同型

$$K(y) = (B/\text{Supp}(y))_{\text{Supp}(y)} \rightarrow (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}} = K(x) \quad (3.16)$$

で得られているからそれらの値群も一致するから $\Gamma_y = \Gamma_x$ となる。

(2) まず $\text{Cont}(A) \subset g^{-1}(\text{Cont}(B))$ を示す。任意の $v \in \text{Cont}(A)$ を取る。任意の $\gamma \in \Gamma_{v|_B}$ について $\{b \in B \mid v|_B(b) < \gamma\} = \{a \in A \mid v(a) < \gamma\} \cap B$ であり、 $v \in \text{Cont}(A)$ よりこれは B で開集合になる。ゆえに $g(v)$ は B で連続なので $\text{Cont}(A) \subset g^{-1}(\text{Cont}(B))$ となる。

逆に、任意の $x \in g^{-1}(\text{Cont}(B)) \subset \text{Spv}(A)$ を取る。 $y := g(x) \in \text{Cont}(B)$ とおく。もし $y \in \text{Cont}(B)_a$ なら (3) の同相性より、ある $x' \in \text{Cont}(A)_a$ が取れて $y = g(x')$ となる。ここで、 $x \in \text{Spv}(A)$ と $x' \in \text{Cont}(A)_a$ で $g(x) = g(x')$ より (3) における g の単射性の議論から $x = x' \in \text{Cont}(A)_a \subset \text{Cont}(A)$ となる。もし $y \notin \text{Cont}(B)_a$ なら $\text{Supp}(y) = \text{Supp}(x) \cap B$ は B で開集合になっていて、 B が A で開集合なので $\text{Supp}(y) \subset \text{Supp}(x)$ より $\text{Supp}(x)$ は A で開集合である。ここで、任意の $\gamma \in \Gamma_x$ で $\text{Supp}(x) \subset \{a \in A \mid x(a) < \gamma\}$ よりこれは A で開集合なので $x \in \text{Cont}(A)$ となる。以上より $\text{Cont}(A) = g^{-1}(\text{Cont}(B))$ となる。□

解析的という性質が射によってどこまで遺伝するかを調べる。とくに adic の場合においてはよい対応を示すことができる。

命題 3.25. $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ を Huber pair の間の連続射とする。 $X := \text{Spa}(A, A^+)$ とし、 $Y := \text{Spa}(B, B^+)$ とする。 f から定まる射を $g: X \rightarrow Y$ とおく。このとき次が成り立つ。

1. $g(X_{na}) \subset Y_{na}$ が成り立つ。
2. f が adic $\implies g(X_a) \subset Y_a$ になる。
3. B が完備かつ $g(X_a) \subset Y_a \implies f$ は adic になる。
4. f が adic $\implies g$ は有理集合の逆像を有理集合に移す。

証明. (1) 任意の $x \in X_{na}$ について $\text{Supp}(g(x)) = \text{Supp}(x \circ f) = f^{-1}(\text{Supp}(x))$ となり、 $\text{Supp}(x)$ は B で開集合なので、 f の連続性から $\text{Supp}(g(x))$ は A の開集合になる。ゆえに $g(x) \in Y_{na}$ であるので $g(X_{na}) \subset Y_{na}$ となる。

(2),(3) f が adic より、 A の定義環 A_0 とその定義イデアル $I \subset A_0$ と、 B の定義環 B_0 で $f(A_0) \subset B_0$ かつ $f(I)B_0$ が B_0 の定義イデアルになるようなものが存在する。

まず、 $g(X_a) \subset Y_a$ を示す。そのためには任意の $x \in X$ について $g(x) \notin Y_a$ ならば $x \notin X_a$ を示せばよい。 $g(x) \notin Y_a$ から $\text{Supp}(g(x)) = f^{-1}(\text{Supp}(x))$ は A で開集合になっている。ゆえに、ある正整数 n が存在して $I^n \subset f^{-1}(\text{Supp}(x))$ となるものが取れる。 $\text{Supp}(x)$ が B のイデアルであることから、 $f(I)^n B_0 \subset \text{Supp}(x)$ となる。これは定義イデアルを含んでいるため、 $\text{Supp}(x)$ は B で開集合になるから $x \notin X_a$ となる。

Y の有理集合 U を取ると、事実 3.16(3) より、ある A の元 s と、 A の有限集合 T であって $T \cdot A \subset A$ が A で開集合となるものによって、 $U = R(T/s)$ と表される。ここで、

$$g^{-1}(U) = g^{-1}(R(T/s)) = \{x \in X \mid g(x) = x \circ f \in R(T/s)\} \quad (3.17)$$

$$= \{x \in X \mid x(f(t)) \leq x(f(s)) \neq 0 (\forall t \in T)\} \quad (3.18)$$

となる。ここで、 $f(T) \cdot B \subset B$ が B で開集合になることを示す。実際、 $T \cdot A$ が A の開集合より、ある正整数 n が存在して $I^n \subset T \cdot A$ となるから、 f で移せば $f(I)^n \subset f(T) \cdot f(A) \subset f(T) \cdot B$ となる。とくに $f(I)^n \cdot B_0 \subset f(T) \cdot B$ であり、 B_0 の定義イデアルを含むので、 $f(T) \cdot B$ は B で開集合になる。したがって $f(T) \subset A$ と $f(s) \in A$ は有理集合の仮定を満たし、上の集合は $R(f(T)/f(s))$ となる。

(3) B が完備であるとする。「 f が adic ではない $\implies g(X_a) \not\subset Y_a$ 」を示せば良い。 B の定義環 B_0 と、その定義イデアル I_B を一つ固定する。 f の連続性から $f^{-1}(B_0)$ は A の開部分環であり、 $f^{-1}(I_B)$ は A の開集合になっている。ここで、 A の部分環 $Z \subset A$ を取ると、これは A の定義環に含まれているからとくに A で有界な部分環である。 $Z \subset f^{-1}(B_0)$ を考えると、命題 1.12(2) から、 A の定義環 A_0 で $A_0 \subset f^{-1}(B_0)$ となるものが存在する。 A_0 の定義イデアル I_A を一つ固定すると、 $f^{-1}(I_B)$ が A の開集合であるので、ある正整数 n で $I_A^n \subset f^{-1}(I_B)$ となるものが取れる。とくに I_A を I_A^n と取り替えることによって、 $I_A \subset f^{-1}(I_B)$ となるとしてよい。すなわち、 $f(A_0) \subset B_0$ かつ $f(I_A) \subset I_B$ となる定義環と定義イデアルが取れているが、 f が adic でないので $f(I_A) \cdot B_0$ は B_0 の定義イデアルにはならない。

このとき $V(I_B) \subsetneq V(f(I_A) \cdot B_0) \subset \text{Spec}(B_0)$ となる。実際、まず $f(I_A) \subset I_B$ から $f(I_A) \cdot B_0 \subset I_B$ より $V(I_B) \subset V(f(I_A) \cdot B_0)$ である。もしこれが等号になったとすると、 $\sqrt{I_B} = \sqrt{f(I_A) \cdot B_0}$ より I_B は B_0 上有限生成だから、生成系の冪のみを考えれば、ある正整数 n で $I_B^n \subset f(I_A) \cdot B_0$ となる。同じく I_A も A 上有限生成だから $f(I_A) \cdot B_0$ も B_0 上有限生成なので、ある正整数 m で $f(I_A)^m B_0 \subset I_B$ となり、 $f(I_A) \cdot B_0$ が B_0 の定義イデアルになってしまい矛盾する。ゆえに $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(B_0)$ で $I_B \not\subset \mathfrak{p}$ かつ $f(I_A) \cdot B_0 \subset \mathfrak{p}$ となるものが取れる。

また、 B_0 が I_B 進完備であることから $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ かつ $I_B \subset \mathfrak{q}$ となる $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ となるものが存在する。 \mathfrak{m} を $\mathfrak{p} \subset B_0$ を含む B の極大イデアルとし、これが求める \mathfrak{q} となることを示す。任意の $x \in I_B$ について、任意の $y \in B_0$ に対して $1 - xy \in B_0$ を取ると、 $xy \in I_B \subset B_0^\circ$ から、 B_0 が I_B 進完備と合わせて命題 1.15(3) の証明から Neumann 級数を考えて $1 - xy \in B_0^\times$ となる。したがって、[AM] Proposition 1.9 より $x \in \text{Jac}(B_0)$ となるので $I_B \subset \text{Jac}(B_0)$ である。とくに $I_B \subset \mathfrak{m}$ であるので、これを \mathfrak{q} として取れば良い。

ここで、 B において $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ かつ $I_B \subset \mathfrak{q}$ かつ $I_B \not\subset \mathfrak{p}$ から、 B の定義環 B_0 に命題 3.23(2) の証明の (a) の議論を適用することが出来る。すなわち、図 5 の A を B として、 B を B_0 として考えることが出来て、 $\text{Supp}(u) = \mathfrak{p}$ となる $u \in \text{Spv}(B_0)$ であって、定義 2.25 のレトラクションによって $r(u) \in$

$\text{Cont}(B_0)_a$ となるものが取れる。さらに $v|_{B_0} = r(u)$ となる $v \in \text{Cont}(B)_a$ が存在し、その horizontal specialization である $w \in \text{Spa}(B, B^+)_a = X_a$ が取れる。とくに horizontal specialization であることから $\text{Supp}(g(w)) = \text{Supp}(w \circ f) = f^{-1}(\text{Supp}(w)) = f^{-1}(\text{Supp}(v))$ となる。 $f(I_A) \subset \mathfrak{p} \subset B_0$ と $\mathfrak{p} = \text{Supp}(u)$ から $v(\mathfrak{p}) = v|_{B_0} = r(u)(\mathfrak{p}) = \{0\}$ である。したがって $f(I_A) \subset \mathfrak{p} \subset \text{Supp}(v)$ であるので $I_A \subset f^{-1}(\text{Supp}(v)) = \text{Supp}(g(w))$ となるので $\text{Supp}(g(w))$ は B で開集合になっているから $g(w) \notin Y_a$ となる。したがって $g(X_a) \not\subset Y_a$ となるので示された。 \square

3.4 Huber pair の完備化

完備な場合について考えるために必要な準備を行う。そのために完備化する前と後で問題なく対象が定義できていることを確認しなければならない。そのためにまずは次の補題を示す。

補題 3.26. A を Huber ring とし、 A_0 を A の任意の定義環で、その任意の定義イデアル I をとる。このとき任意の正整数 n について $\widehat{I}^n = \widehat{I}^n \subset \widehat{A}$ が成り立つ。また、 $\widehat{I}^n \cap A = I^n \subset \widehat{A}$ となる。

証明. $\widehat{I}^n = \widehat{I}^n$ を示す。 I は A_0 の有限生成イデアルであるから、[AM] Proposition 10.13 より自然な準同型 $\widehat{A}_0 \otimes_{A_0} I^n \rightarrow \widehat{I}^n$ は全射になるので $\widehat{I}^n = \widehat{A}_0 I^n \subset \widehat{A}_0 \subset \widehat{A}$ となる。[AM] Proposition 10.15 の証明と同様にして、 $\widehat{I}^n = \widehat{A}_0 I^n = (\widehat{A}_0 I)^n = \widehat{I}^n$ となる。

$\widehat{I}^n \cap A = I^n$ を示す。まず、 $I^n \subset \widehat{I}^n = \widehat{I}^n$ から $I^n \subset \widehat{I}^n \cap A$ は明らか。逆に任意の $\alpha \in \widehat{I}^n \cap A$ について $\alpha \in A$ からなる定数数列 $(\alpha)_{k=0}^\infty$ は \widehat{A} において α を表す。一方、 $\alpha \in \widehat{I}^n = \widehat{I}^n$ より得られる α を表す I^n 内のコーシー列 $(\alpha_k)_{k=0}^\infty$ が存在する。すなわち、 \widehat{A} のもとの定義 $\varprojlim A/I^k$ においてコーシー列 $(\alpha)_{k=0}^\infty$ と $(\alpha_k)_{k=0}^\infty$ は同値なコーシー列になっているので、十分大きい正整数 N について $\alpha - \alpha_N \in I^n$ であるから $\alpha_N \in I^n$ より $\alpha \in I^n$ となる。したがって $\widehat{I}^n \cap A \subset I^n$ となることがわかった。 \square

これを用いて整元環の完備化がまた整元環になっていることなどを示す。

命題 3.27 ([Con] Remark 11.5.2). (A, A^+) を Huber pair とする。まず、完備化 (定義 1.17) を取ると A^+ の位相は A による相対位相が入っていることから、 $\widehat{A}^+ \rightarrow \widehat{A}$ は単射になるので部分環とみなすことが出来る。このとき、 \widehat{A}^+ は \widehat{A} の中で開かつ整閉な部分環になる (とくに \widehat{A}^+ は \widehat{A} の整元環になる)。

また、冪有界元について $\widehat{A}^\circ = \widehat{A}^\circ$ となる。

証明. \widehat{A}^+ について示す。 A のある定義環 A_0 の定義イデアル I を一つ固定し、これによる完備化として考える。 A^+ は A の開集合より、ある正整数 n で $I^n \subset A^+$ となる。完備化すれば $\widehat{I}^n \subset \widehat{A}^+$ であり、 \widehat{I} は A の定義イデアルになるから \widehat{A}^+ は A の開部分環になる。

$x \in \widehat{A}$ が \widehat{A}^+ 上整であるとする、ある $a'_0, \dots, a'_{n-1} \in \widehat{A}^+$ で $x^n + a'_{n-1}x^{n-1} + \dots + a'_1x + a'_0 = 0 \in \widehat{A}$ となる。ここで、 $\widehat{I}^n \subset \widehat{A}^+$ について $x - y \in \widehat{I}^n$ かつ $a'_j - a_j \in \widehat{I}^n$ となる $y \in A$ と $a_j \in A^+$ が取れる。ゆえに $y \in x + \widehat{I}^n$ かつ $a_j \in a'_j + \widehat{I}^n$ であることと、 x についての整従属式から $y^n + a_{n-1}y^{n-1} + \dots + a_1y + a_0 \in \widehat{I}^n \cap A$ となる。補題 3.26 より $\widehat{I}^n \cap A = I^n \subset A^+$ であるので、 $y \in A$ は A^+ 上整である。ゆえに整閉性から $y \in A^+$ となる。したがって $x \in y + \widehat{I}^n \subset A^+ + \widehat{I}^n \subset \widehat{A}^+$ より、 \widehat{A}^+ は \widehat{A} で整閉である

$\widehat{A}^\circ = \widehat{A}^\circ$ を示す。 A° は A で開集合なので、ある正整数 n が存在して $I^n \subset A^\circ$ となる。任意の $x \in \widehat{A}^\circ$

にたいし、ある $y \in A^\circ$ が存在して $x - y \in \widehat{I}^n \subset \widehat{A}^\circ$ となる。 y が A で冪有界であるので、任意の正整数 N について、ある正整数 m が存在して $\{y^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot I^m \subset I^N$ であるから、 $\{y^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m \subset \widehat{I}^N$ となる。また、 $x \in y + \widehat{I}^n$ より $\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \subset \{y^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} + \widehat{I}^n$ であることがわかる。ゆえに m を十分大きく取り直せば

$$\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m \subset \{y^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m + \widehat{I}^{n+m} \subset \widehat{I}^N \quad (3.19)$$

と出来るから、 $x \in \widehat{A}^\circ$ となるので $\widehat{A}^\circ \subset \widehat{A}^\circ$ である。

逆に $x \in \widehat{A}^\circ$ について、各 $l \in \mathbb{Z}^+$ について $x - y_l \in \widehat{I}^l$ となる $y_l \in A$ が取れる。とくに $\lim_{l \rightarrow \infty} y_l = x \in \widehat{A}$ となる。 $y_l \in A^\circ$ を示す。 x は \widehat{A} で冪有界であるから、任意の正整数 N について、ある正整数 m が存在して $\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m \subset \widehat{I}^N$ である。また、各 $l \in \mathbb{Z}^+$ について $y_l \in x + \widehat{I}^l$ から $\{y_l^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \subset \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} + \widehat{I}^l$ となる。したがって、

$$\{y_l^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m \subset \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot \widehat{I}^m + \widehat{I}^{N+m} \subset \widehat{I}^N \quad (3.20)$$

となるので補題 3.26 から $\{y_l^k \mid k \in \mathbb{Z}^+\} \cdot I^m \subset \widehat{I}^N \cap A = I^N$ より $y_l \in A^\circ$ となる。したがって $x = \lim_{l \rightarrow \infty} y_l \in \widehat{A}^\circ$ となるので $\widehat{A}^\circ \subset \widehat{A}^\circ$ である。□

以上より、Huber pair の完備化というものを自然に定義できる。

定義 3.28 (完備化). (A, A^+) を Huber pair とする。 (A, A^+) の完備化 (completion) とは $(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ という Huber pair のことである。ここで、 \widehat{A} は定義 1.17 における Huber ring の完備化であり命題 3.27 によって \widehat{A} の整元環になることがわかっている \widehat{A}^+ のことである。とくに \widehat{A}^+ を \widehat{A}^+ と書くこともある。

[Hu93] における主要な結果の一つである、完備化によって adic spectrum が変わらないという定理 3.32 を示す。そのために必要な補題を準備する。

補題 3.29 ([Mor] Lemma III.3.2). A を完備 adic ring とする。 I を A の定義イデアルで $I = (a_1, \dots, a_r)$ と表されているとする。このとき任意の $a'_i \in a_i + I^2$ について $I = (a'_1, \dots, a'_r)$ となる。

証明. まず $(a'_1, \dots, a'_r) \subset I$ より A 線形写像

$$u': A^{\oplus r} \longrightarrow I \quad (3.21)$$

$$(b_1, \dots, b_r) \longmapsto b_1 a'_1 + \dots + b_r a'_r \quad (3.22)$$

を定義する。とくに $u'(A^{\oplus r}) = (a'_1, \dots, a'_r)$ となるから、 u' が全射になることを示せば良い。ここで、 A 加群 $A^{\oplus r}$ の I フィルター $(I^n A^{\oplus r})_n$ と、 A 加群 I の I フィルター $(I^{n+1})_n$ を考えると、 $u'(I^n A^{\oplus r}) \subset I^{n+1}$ から、 u' はこのフィルターに関するフィルター付き加群の準同型になっている。ゆえに、[AM] Lemma 10.23 より u' から誘導される次数付き加群への準同型

$$G(u'): G(A^{\oplus r}) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^n A^{\oplus r} / I^{n+1} A^{\oplus r} \longrightarrow G(I) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^{n+1} / I^{n+2} \quad (3.23)$$

が全射であれば完備化に誘導される射 $\widehat{u}': \widehat{A}^{\oplus r} \rightarrow \widehat{I}$ が全射になる。 A は完備であるので $\widehat{A}^{\oplus r} = A^{\oplus r}$ かつ $\widehat{I} = I$ から u' は全射になる。ゆえに $G(u')$ が全射であることを示せばよく、とくに

$$G_n(u'): I^n A^{\oplus r} / I^{n+1} A^{\oplus r} \longrightarrow I^{n+1} / I^{n+2} \quad (3.24)$$

$$\bar{x} \longmapsto \overline{u'(x)} \quad (3.25)$$

が全射であることを示せばよい。また、 A 線形写像

$$u: A^{\oplus r} \longrightarrow I \quad (3.26)$$

$$(b_1, \dots, b_r) \longmapsto b_1 a_1 + \dots + b_r a_r \quad (3.27)$$

についても同様に $u(I^n A^{\oplus r}) \subset I^{n+1}$ が成り立っているので $G(u): G(A^{\oplus r}) \rightarrow G(I)$ が定義できる。とくに $I = (a_1, \dots, a_r)$ より u は全射であるので $G(u)$ は全射になる。

$G_n(u') = G_n(u)$ を示す。ここで $a'_i \in a_i + I^2$ から、 $\alpha_i \in I^2$ について $a'_i = a_i + \alpha_i$ と表す。任意の $I^n A^{\oplus r}$ の元 $\sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1}, \dots, b_{ir})$ をとる。ただし $\beta_i \in I^n$ かつ $(b_{i1}, \dots, b_{ir}) \in A^{\oplus r}$ とする。 u' で移すと、

$$u' \left(\sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1}, \dots, b_{ir}) \right) = \sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1} a'_1 + \dots + b_{ir} a'_r) = \sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1} a_1 + \dots + b_{ir} a_r) + \sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1} \alpha_1 + \dots + b_{ir} \alpha_r) \quad (3.28)$$

である。 $\alpha_i \in I^2$ かつ $\beta_i \in I^n$ より (3.28) の二項目は I^{n+2} に含まれる。ゆえに I^{n+1} / I^{n+2} において

$$G_n(u') \left(\overline{\sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1}, \dots, b_{ir})} \right) = \overline{\sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1} a_1 + \dots + b_{ir} a_r)} = G_n(u) \left(\overline{\sum_{i=1}^m \beta_i(b_{i1}, \dots, b_{ir})} \right) \quad (3.29)$$

となるから $G_n(u') = G_n(u)$ となる。ゆえに $G_n(u)$ の全射性から $G_n(u')$ も全射より $G(u')$ は全射になる。上述したようにこれは u' が全射ということになるので $I = (a'_1, \dots, a'_r)$ となる。□

補題 3.30. (A, A^+) を Huber pair とする。 $X \subset \text{Spa}(A, A^+)$ を quasi-compact な部分集合とする。 $s \in A$ が任意の $x \in X$ で $x(s) \neq 0$ となっているとする。このとき $0 \in A$ の開近傍 U であって任意の $x \in X$ と任意の $u \in U$ について $x(u) < x(s)$ となるものが存在する。

証明. A のある定義環の定義イデアルの有限個からなる生成系 T をとる。とくに $T \cdot A^\circ$ は A の開集合になるように取れる。任意の正整数 n について $T(n) := \{t_1 \dots t_n \in A \mid t_1, \dots, t_n \in T\}$ とする。このとき、

$$X_n := \{x \in \text{Spa}(A, A^+) \mid x(t) \leq x(s) \neq 0, \forall t \in T(n)\} \quad (3.30)$$

という集合をとる。このとき $T(n)$ は有限集合である。 T^n が $T(n)$ の元の有限和で書けていることから、 $T(n) \cdot A = T^n \cdot A \supset T^n \cdot A^\circ$ となるので $T(n) \cdot A$ は A で開集合になる。ゆえに $X_n = R(T(n)/s)$ と有理集合になるため X_n は $\text{Spa}(A, A^+)$ で開集合になる。

ここで、任意の $x \in X$ について $x(s) \neq 0$ より $\{a \in A \mid x(a) < x(s)\}$ は x の連続性より A で開集合になっている。すると定義イデアルの生成系であることから、十分大きい正整数 n で $T(n) \subset \{a \in A \mid x(a) < x(s)\}$ となるので $t \in T(n)$ で $x(t) < x(s)$ から $x \in X_n$ となるので $X \subset \bigcup_{n \geq 0} X_n$ となる。 X が quasi-compact かつ X_n が開集合であるから、有限個の正整数 m_1, \dots, m_r について $X \subset X_{m_1} \cup \dots \cup X_{m_r}$ となる。

T は定義イデアルの生成系だから $T \subset A^\circ$ であるので定理 3.6 から任意の $t \in T$ と任意の $x \in X$ で $x(t) < 1$ となっている。 $T(n+1)$ の元 $t_1 \dots t_n t_{n+1}$ をとる。任意の $x \in X_n$ について $x(t_1 \dots t_n t_{n+1}) < x(t_1 \dots t_n) \leq x(s) \neq 0$ から $X_n \subset X_{n+1}$ となる。ゆえに m_1, \dots, m_r の最大値 m をとることで $X \subset X_m$ となる。

$U := T(m) \cdot A^{\circ\circ} \subset A$ が求める U になることを示す。 $0 \in U$ は明らかであり、とくに $U = T^m \cdot A^{\circ\circ}$ より U は $0 \in A$ の開近傍になっている。さらに任意の $u \in U$ と $x \in X$ をとる。ここである正整数 n と $t_i \in T(m)$ と $a_i \in A^{\circ\circ}$ が存在して $u = \sum_{i=1}^n t_i a_i$ と表せる。すると $a_i \in A^{\circ\circ}$ から定理 3.6 より $x(a_i) < 1$ であるので

$$x(u) = x\left(\sum_{i=1}^n t_i a_i\right) \leq \max\{x(t_i)x(a_i) \mid i = 1, \dots, n\} < \max\{x(t_i) \mid i = 1, \dots, n\} \quad (3.31)$$

となる。 $t_i \in T(m)$ と $x \in X \subset X_m$ から $x(t_i) \leq x(s)$ より $x(u) < x(s)$ となる。したがってこの $U = T(m) \cdot A^{\circ\circ}$ が求める U になっている。□

補題 3.31. (A, A^+) を完備 Huber pair とする。 $s, t_1, \dots, t_n \in A$ について、 $I := (t_1, \dots, t_n) \subset A$ が開集合になっているとする。このとき A における $0 \in A$ の開近傍 U が存在していて、任意の $s' \in s + U$ 任意の $t'_i \in t_i + U$ について $I' := (t'_1, \dots, t'_n) \subset A$ が開集合になっている、

$$R\left(\frac{t_1, \dots, t_n}{s}\right) = R\left(\frac{t'_1, \dots, t'_n}{s'}\right) \quad (3.32)$$

となる。

証明. (Step 1) A_0 を A の定義環とする。 I は A で開集合であるので A_0 の定義イデアルのある冪を含む。とくにこれを $r_j \in A_0$ によって $J := r_1 A_0 + \dots + r_m A_0$ とおく。これも A_0 の定義イデアルになり $J \subset I$ となる。 $r_j \in I = t_1 A + \dots + t_n A$ より、ある $a_{ij} \in A$ がとれて $r_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} t_i$ と表される。ここで有限集合 $\{a_{ij} \mid 1 \leq j \leq m, 1 \leq i \leq n\}$ は有界であるので $J^2 \subset A$ という開集合について、ある $0 \in A$ の開近傍 U' が存在して任意の a_{ij} で $a_{ij} \cdot U' \subset J^2$ となる。任意の $t'_i \in t_i + U'$ を $b_i \in U'$ によって $t'_i = t_i + b_i$ と表す。すると、 $a_{ij} b_i \in a_{ij} \cdot U' \subset J^2$ から

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} t'_i = \sum_{i=1}^n a_{ij} (t_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_{ij} t_i + \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i \in r_j + J^2 \quad (3.33)$$

となる。 A_0 が J を定義イデアルとして持つ完備 adic ring であるので補題 3.29 より任意の $r'_j \in r_j + J^2$ について $J = r'_1 A_0 + \dots + r'_m A_0$ となる。ゆえに $\sum_{i=1}^n a_{ij} t'_i \in r_j + J^2$ より

$$J = \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} t'_i\right) A + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{im} t'_i\right) A \subset t'_1 A + \dots + t'_n A \quad (3.34)$$

となる。ゆえに J が A_0 の定義イデアルだから $t'_1 A + \dots + t'_n A$ は A で開集合になる。

(Step 2) $t_0 := s$ として $I = (t_1, \dots, t_n) \subset (t_0, \dots, t_n)$ から (t_0, \dots, t_n) は A で開集合になるので有理集合 $R_i := R(\{t_0, \dots, t_n\}/t_i) \subset \text{Spa}(A, A^+)$ が取れる。とくに事実 3.16 から R_i は quasi-compact になっていて、任意の $x \in R_i$ について $x(t_i) \neq 0$ より補題 3.30 から、ある $0 \in A$ の開近傍 U''_i が存在して任意の $x \in R_i$ と任意の $u \in U''_i$ で $x(u) < x(t_i)$ となる。 $U := \bigcap_{i=0}^n U''_i$ とすると $0 \in A$ の開近傍が存在して任意の $i \in \{0, \dots, n\}$ について任意の $x \in R_i$ と任意の $u \in U''$ について $x(u) < x(t_i)$ となる。

(Step 3) ここで $0 \in A$ の開近傍 $U := U' \cap U'' \cap A^{\circ\circ}$ をとる。これが求める U になっていることを示す。まず、任意の $t'_i \in t_i + U \subset t_i + U'$ について (Step 1) で示したように $I' = (t'_1, \dots, t'_n)$ は A で開集合になる。任意の $t'_i \in t_i + U$ について $R_0 = R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/t_0)$ を示す。

まず、 $x \in R_0$ について $t'_i - t_i \in U \subset U''$ から (Step 2) より $i = 0, \dots, n$ について $x(t'_i - t_i) < x(t_0) \neq 0$ となる。さらに任意の $i = 1, \dots, n$ について $x \in R_0$ から $x(t_i) \leq x(t_0)$ より

$$x(t'_i) = x(t_i + (t'_i - t_i)) \leq \max\{x(t_i), x(t'_i - t_i)\} \leq x(t_0) \quad (3.35)$$

となる。ここで $x(t'_0 - t_0) < x(t_0) = x(-t_0)$ より非アルキメデスの性質から $x(t_0) = x((t'_0 - t_0) + t_0) = x(t'_0)$ なので $i = 1, \dots, n$ について $x(t'_i) \leq x(t'_0)$ より $x \in R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/t'_0)$ となる。

逆に $x \in \text{Spa}(A, A^+) \setminus R_0$ をとる。 $R_0 = R(\{t_1, \dots, t_n\}/t_0)$ より次の二通りの場合がある。

- (1) 任意の $i \in \{0, \dots, n\}$ について $x(t_i) = 0$ となる。
- (2) ある $i \in \{0, \dots, n\}$ で $x(t_i) \neq 0$ かつ、ある $j \in \{1, \dots, n\}$ が存在して $x(t_0) < x(t_j)$ となる。

(1) $t_0, \dots, t_n \in \text{Supp}(x)$ から $I \subset \text{Supp}(x)$ より $\text{Supp}(x)$ は開集合になる。 $U \subset A^\circ$ として取っていたので $t'_0 - t_0 \in U \subset A^\circ$ なので、十分大きい正整数 n で $(t'_0 - t_0)^n \in \text{Supp}(x)$ である。 $\text{Supp}(x)$ は素イデアルなので $t'_0 - t_0 \in \text{Supp}(x)$ となる。すると

$$x(t'_0) \leq \max\{x(t'_0 - t_0), x(t_0)\} = 0 \quad (3.36)$$

となるので $t'_0 \in \text{Supp}(x)$ である。したがって $x \notin R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/t'_0)$ となる。

(2) とくに $x(t_i)$ の最大値を考えると、ある $j \in \{1, \dots, n\}$ で $x \in R_j$ となる。 $i \in \{0, \dots, n\}$ について $t'_i - t_i \in U \subset U''$ から (Step 2) より $x(t'_i - t_i) < x(t_j)$ となる。よって

$$x(t'_0) = x(t_0 + (t'_0 - t_0)) \leq \max\{x(t_0), x(t'_0 - t_0)\} < x(t_j) \quad (3.37)$$

となる。ここで $x(t'_j - t_j) < x(t_j) = x(-t_j)$ より非アルキメデスの性質から $x(t_j) = x((t'_j - t_j) + t_j) = x(t'_j)$ なので $x(t'_0) < x(t'_j)$ となる。ゆえに $x \notin R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/t'_0)$ となる。

以上より $R(\{t_1, \dots, t_n\}/s) = R_0 = R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/t'_0)$ となることが示されたのでこの $U = U' \cap U'' \cap A^\circ$ を取れば良い。 \square

定理 3.32. (A, A^+) を Huber pair とし、自然な射 $(A, A^+) \rightarrow (\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ から得られる adic spectrum の間の射 $g: \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+) \rightarrow \text{Spa}(A, A^+)$ は同相になる。さらに g は有理集合を有理集合に移し合う。

証明. g の全射性を示す。 $x \in \text{Spa}(A, A^+) \subset \text{Cont}(A)$ から連続性より \widehat{A} 上の連続付値 $\widehat{x} \in \text{Cont}(\widehat{A})$ へと拡張できる。とくに \widehat{A}^+ について $x(A^+) \leq 1$ と連続性から $\widehat{x}(\widehat{A}^+) \leq 1$ となる。ゆえに $\widehat{x} \in \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ かつ $g(\widehat{x}) = x$ より g は全射である。

g の単射性を示す。 $x, y \in \text{Spa}(A, A^+)$ について $g(x) = g(y)$ のとき A が \widehat{A} で稠密かつ x と y の連続性から $x = y$ となるので g は単射になる。

有理集合の逆像は有理集合になること。 A の定義環 A_0 について \widehat{A} の定義環 \widehat{A}_0 が取れて、 $A_0 \rightarrow \widehat{A}_0$ となる。また、 A_0 の定義イデアル I について \widehat{A}_0 の定義イデアルは補題 3.26 より $\widehat{I} = I\widehat{A}_0$ である。ゆえに $A \rightarrow \widehat{A}$ は adic 射であるので命題 3.25(4) より g による有理集合の逆像は有理集合になる。

有理集合の像が有理集合になること。 任意に有理集合 $U = R(\{t_1, \dots, t_n\}/s) \subset \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ をとる。補題 3.31 から、ある $0 \in A$ の開近傍 V が存在して、とくに $i \in \{1, \dots, n\}$ で任意の $t'_i \in t_i + V$ について $I' := t'_1 A + \dots + t'_n A$ は A で開集合であり、 $U = R(\{t'_1, \dots, t'_n\}/s)$ となる。とくに A は \widehat{A} で稠

密より、 $(t_i + V) \cap A \neq \emptyset$ から、 $t'_i \in A$ ととれる。 $\iota: A \rightarrow \widehat{A}$ とすると、 $T := \{t'_1, \dots, t'_n\} \subset A$ について、 $\iota(T) \cdot A \subset A$ が開集合より、有理集合 $R(\iota(T)/\iota(s)) \subset \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ が定義できて、上で述べたとおり $U = R(\iota(T)/\iota(s))$ となる。^{*12}事実 3.16 から U は $\text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ で quasi-compact である。 g の連続性から $g(U) = \{x \circ \iota \in \text{Spa}(A, A^+) \mid x \in U\}$ は $\text{Spa}(A, A^+)$ で quasi-compact である。さらに任意の $x \in U$ について $(x \circ \iota)(s) \neq 0$ より、補題 3.30 から、ある $0 \in A$ の開近傍 W であって任意の $w \in W$ と任意の $x \circ \iota \in g(U)$ について $(x \circ \iota)(w) < (x \circ \iota)(s)$ となる。ここで、 A のある定義環の定義イデアルの有限個からなる生成系 S について、ある正整数 N が存在して $S(N) = \{s_1 \dots s_N \mid s_1, \dots, s_N \in S\} \subset W$ となる。 $D := S(N)$ とすると $S^N \subset D \cdot A$ で S が定義イデアルの生成系より $D \cdot A$ は A で開集合になる。すると、 $(T \cup D) \cdot A \supset D \cdot A$ から $\text{Huber}(T \cup D) \cdot A$ は A で開集合であるので有理集合 $R = R((T \cup D)/s) \subset \text{Spa}(A, A^+)$ が取れる。

$g(U) = R$ となることを示す。まず、 $x \in U$ をとって $g(U)$ の元 $g(x)$ をとる。このとき任意の $t \in T$ について $x \in U = R(\iota(T)/\iota(s))$ から $g(x)(t) = x(\iota(t)) \leq x(\iota(s)) = g(x)(s)$ である。また、任意の $d \in D$ について $D \subset W$ から $g(x)(d) = x \circ \iota(d) < x \circ \iota(s) = g(x)(s)$ である。以上より $g(x) \in R = R((T \cup D)/s)$ となるので $g(U) \subset R$ となる。

逆に、任意の $x \in R$ について g の全単射性からただ一つの $y \in \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ で $g(y) = x$ となるものがとれる。ここで $T \subset A$ と $s \in A$ から任意の $t \in T$ と s について $x(t) = y(t)$ と $x(s) = y(s)$ ゆえ $y \in UR(\iota(T)/\iota(s))$ より $x = g(y) \in g(U)$ である。以上より $x \in g(U)$ となるので、 $g(U) = R$ となる。したがって $\text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+)$ の任意の有理集合 U について $g(U)$ は $\text{Spa}(A, A^+)$ の有理集合になる。

ゆえに g の全単射性と合わせて $g: \text{Spa}(\widehat{A}, \widehat{A}^+) \rightarrow \text{Spa}(A, A^+)$ は同相であり、有理集合を有理集合に移し合う。□

参考文献

- [BV] K. Buzzard and A. Verberkmoes, “Stably uniform affinoids are sheafy,” arXiv:1404.7020 [math], Sep. 2015, Accessed: Aug. 02, 2021. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1404.7020>
- [Mor] S. Morel, “Adic spaces”, [Online]. Available: http://perso.ens-lyon.fr/sophie.morel/adic_notes.pdf
- [Wed] T. Wedhorn, “Adic Spaces,” arXiv:1910.05934 [math], Oct. 2019, Accessed: Jul. 11, 2021. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1910.05934>
- [Hu94] R. Huber, “A generalization of formal schemes and rigid analytic varieties,” Math Z, vol. 217, no. 1, pp. 513 – 551, Sep. 1994, doi: 10.1007/BF02571959.
- [Hu93] R. Huber, “Continuous valuations,” Math Z, vol. 212, no. 1, pp. 455 – 477, Jan. 1993, doi: 10.1007/BF02571668.
- [SW] P. Scholze and J. Weinstein, Berkeley lectures on p-adic geometry. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2020.
- [Ran] D. Rankeya, “HUBER RINGS”, [Online]. Available: https://rankeya.people.uic.edu/Huber_rings.pdf

^{*12} $\iota(T) \cdot \widehat{A}$ は \widehat{A} で開集合になることはわかっているが、まだ $T \cdot A$ が A で開集合になるかどうかはわかっていない。そこで、開集合にするために補題 3.30 を用いて取れる摂動 D を足すことで有理集合を定義できるようにしている。

- [Con] B. Conrad, “Number theory learning seminar.”,[Online]. Available: <http://virtualmath1.stanford.edu/~conrad/Perfseminar/> (accessed Jul. 18, 2021).
- [Mur] T. Murayama, “Continuous valuations and the adic spectrum” , [Online]. Available: <http://www-personal.umich.edu/~takumim/Huber.pdf>
- [GR] O. Gabber and L. Ramero, “Foundations for almost ring theory – Release 7.5,” arXiv:math/0409584, Sep. 2018, Accessed: Dec. 22, 2020. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/math/0409584>
- [AM] M. F. Atiyah and G. Macdonald, Introduction to Commutative Algebra. Addison-Wesley, 1994.
- [MSE1] “general topology - Relative closure theorem,” Mathematics Stack Exchange. <https://math.stackexchange.com/questions/2649922/relative-closure-theorem> (accessed Aug. 30, 2021).
- [SE1] “abstract algebra - Linearly disjoint fields - Mathematics Stack Exchange.” <https://math.stackexchange.com/questions/2786433/linearly-disjoint-fields> (accessed Aug. 30, 2021).